



# Atanga

SOIA

GRUPA 0

- ✓ Potețial ridicat de producție.
- ✓ Talie medie spre înaltă cu rezistență foarte bună la fânger și rezistență față de nematozi
- ✓ Culoarea hilului galbenă.
- ✓ Creștere nedeterminată.



## FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Vigoare după răsărire

medie

Toleranța față de scuturare

bună

Rezistența la cădere

bună

Potențial de producție

foarte ridicat

Toleranța față de Peronospora

medie

Toleranța față de Sclerotinia

medie

Toleranța față de bacterioze

medie

Toleranța față de viroze

bună

## CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

### Tip de creștere

Nedeterminată

### Precocitatea recoltării

Tardivă

### Înălțime inserție păstăi

Mijlociu - înaltă

### Culoare hil

Deschisă

### Conținut de grăsimi (%)

Mediu-ridicat

### Precocitatea înflorii

Tardivă

### Înălțimea plantei

Mijlociu-înaltă

### Culoare inflorescență

Violet

### Masa a o mie de boabe (grame)

190 - 250

### Conținut de proteină (%)

40 - 42% (în medie)

## CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

### Zonare și recomandări

Recomandat în toate zonele de cultură ale soiei, cu precădere în Podisul Transilvaniei, nord-estul și vestul țării

### Norma de semănare (se calculează în funcție de germinatie și MMB)


50-55 boabe/mp, la o adâncime de 3-4 cm

### Perioada recomandată de semănat

A doua decadă a lunii aprilie, chiar până la început de mai (în funcție de condițiile climatice și de istoricul zonei de cultură)

### Distanța optimă între rânduri (cm)

15-24



### Legendă

- Rețeaua de testare proprie a Donau Saat și centre de testare a solurilor și hibrizilor
- Câmpuri demonstrative sau testare ale partenerilor

