

## MONROE

### Semitardiv | Orz toamnă (malț)

- Din recoltele de MONROE este alimentata cu malț întreaga producție a berii Gösser
- Este principalul soi de orz pentru bere propus de Donau Saat datorita unei adaptări pedo-climatice foarte bună exprimată prin constanța producțiilor din fermele unde a fost cultivat.



### CARACTERISTICI MORFOLOGICE SI TEHNICE

Potențial de producție	ridicat
Tipul spicului	aristat, compact
Înspicare	semi-tardiva
Maturitate	semi-tardivă
Înălțimea plantei	medie-joasă / 65-80 cm
Capacitate de înfrățire	mare
Număr de boabe în spic	mare
Masa a o mie de boabe (grame)	
Masa hectolitrică (kg/hl)	medie
Calibraj (boabe > 2.2 mm)	mare

### FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Toleranța față de ger	medie-joasă
Rezistența la înclinare și cădere	medie
Rezistența la frângere	medie-bună
Rezistența la căderea spicelor	medie
Toleranța față de Blumeria (făinare)	medie
Toleranța față de BYDV (virusul piticirii)	mediu-slaba
Toleranța față de BYMV (virusul mozaic)	foarte bună
Toleranța față de Monographella n. (mucegaiul zăpezii)	medie

## CARACTERISTICI MORFOLOGICE SI TEHNICE

Calibraj (boabe < 2.5 mm)	ridicat
Conținut de proteină	mediu
Conținut de fibră	mare


## FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Toleranța față de rugini	mediu-slabă
Toleranța față de Pyrenophora (pătarea reticulară)	mediu-slabă
Toleranța față de Rhynchosporium (arsura frunzelor)	bună
Toleranța față de Ramularia	mediu-slaba

Pentru rezultate de productie superioare si un management integrat al combaterii bolilor si daunatorilor se recomanda respectarea asolamentului si aplicarea dozelor omologate a produselor de uz fitosanitar (in conformitate cu prevederile din editia actualizata a CODEX ului).

Cu acelasi scop recomandam aplicarea a 2 tratamente fungicide cu rol preventiv precum si utilizarea produselor cu rol biostimulator si de nutritie in functie de carente si necesitati.

# MONROE



Surse:  
rețeaua de testare proprie a Donau Saat  
centre oficiale de testare a soiurilor

## CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări	Recomandat in toate zonele de cultură a orzului. Pentru încadrarea în parametrii de malțificare trebuie reduse aporturile de N. Semănatul optim se poate încadra în ultima decadă din septembrie respectiv până în prima decadă din octombrie.
Norma de semănare	300 - 380 b.g./mp

**DAN FLOREA**

Director zonal de vanzari

**NICOLETA BOGHICI**

Director zonal de vanzari

**MIHAI VINTU**

Director zonal de vanzari

Cluj, Mures, Harghita, Covasna,  
Brasov, Sibiu, Huneadoara, Alba

+40 (0)75 701 3954  
dan.florea@donausaat.com

### **ANDREI BOSZORMENYI**

Director zonal de vanzari

Timis, Caras-Severin, Arad, Bihor,  
Satu Mare

+40 (0)722 294 217  
andrei.boszormenyi@donausaat.com

Dolj, Olt, Gorj, Valcea, Mehedinti

+40 (0)75 116 9840  
nicoleta.boghici@donausaat.com

### **IONUT STEFAN**

Director zonal de vanzari

Teleorman, Giurgiu, Arges,  
Dambovita, Prahova, Ilfov

+40 (0)741 181 062; +40 (0)765 716  
606;  
ionut.stefan@donausaat.com

Botosani, Suceava, Iasi, Neamt,  
Vaslui, Bacau, Vrancea, Galati

+40 (0)75 701 3953  
mihai.vintu@donausaat.com