

ALVAREZ IR

Maturitate medie | Tehnologie IMI

- Hibrid consacrat in portofoliu, pentru sistemul de cultura cu rezistenta la ierbicide pe baza de imazamox
- Beneficiază de unul dintre cele mai mari grade ale plasticității ecologice din tot portofoliul
- Recomandat pentru toate zonele de cultură a florii soarelui, în special în regiunile cu infestare de Orobanche spp.



CARACTERISTICI MORFOLOGICE SI TEHNICE

Precocitatea înfloririi	semi-timpurie
Precocitatea recoltării	semi-tardiva
Perioada de vegetație până la maturitate (nr. zile de la răsărire)	121 - 123 zile
Număr de zile până la înflorire (nr. zile de la răsărire)	60-67 zile
Înălțimea plantei	medie / 180-190 cm
Diametrul calatidiului (cm)	22
Forma calatidiului	ușor convexă
Poziția calatidiului	aplecat cu tija foarte curbată
Masa hectolitrică (kg/hl)	40
Masa a o mie de boabe (grame)	48
Conținut de ulei (%)	39
Conținut de acid oleic	scăzut


FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Vigoare la pomirea în vegetație	foarte bună
Toleranța față de secetă	foarte bună
Rezistența la înclinare și frângere	foarte bună
Rezistanța la frângerea tije sub calatidiu	medie
Rezistența la scuturare	foarte bună
Potențial de producție	foarte ridicat
Toleranța față de Plasmopara (infecție primară)	foarte bună
Toleranța față de Plasmopara (infecție secundară)	mediu-slabă
Toleranța față de Sclerotiniala calatidiu	bună
Toleranța față de Sclerotiniala colet	mediu-slabă
Toleranța față de Phomopsis	buna
Toleranța față de Botrytis	buna
Toleranța față de Orobanche Spp. (Lupoaie)	nerezistent

Pentru rezultate de productie superioare si un management integrat al combaterii bolilor si daunatorilor se recomanda respectarea asolamentului si aplicarea dozelor omologate a produselor de uz fitosanitar (in conformitate cu prevederile din editia actualizata a CODEX ului).

Cu acelasi scop recomandam aplicarea a 2 tratamente fungicide cu rol preventiv precum si utilizarea produselor cu rol biostimulator si de nutritie in functie de carente si necesitati.

ALVAREZ IR



CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări	Recomandat în toate zonele de cultură a florii soarelui inclusiv în zonele infestate cu Orobanche spp. cu condiția aplicării de erbicide cu s.a. imazamox cu doză completă în stadiul de 6-8 funze a florii soarelui
Tehnologia de cultură	Compatibil cu tehnologia de erbicidare cu s.a. imazamox
Norma de semănare în condiții de neirigat	50.000 - 55.000 plante / ha
Norma de semănare în condiții de irigat	60.000 - 65.000 plante / ha

DAN FLOREA

Director zonal de vanzari

Cluj, Mures, Harghita, Covasna,
Brasov, Sibiu, Huneadoara, Alba

+40 (0)75 701 3954
dan.florea@donausaat.com

NICOLETA BOGHICI

Director zonal de vanzari

Dolj, Olt, Gorj, Valcea, Mehedinti

+40 (0)75 116 9840
nicoleta.boghici@donausaat.com

MIHAI VINTU

Director zonal de vanzari

Botosani, Suceava, Iasi, Neamt,
Vaslui, Bacau, Vrancea, Galati

+40 (0)75 701 3953
mihai.vintu@donausaat.com

DONAU SAAT ROMANIA

Teleorman, Giurgiu, Arges, Dambovita,
Prahova, Ilfov

+40 (0)74 569 7455
office@donausaat.com,