

AMICUS

Foarte semitimpuriu | Nearistat

- Soi de mare productivitate cu capacitatea de a asigura calitatea solicitată de morari
- Principalele caracteristici sunt timpurietatea și stabilitatea producțiilor
- Cel mai timpuriu dintre soiurile consacrate; foarte bună rezistență la cădere



CARACTERISTICI MORFOLOGICE SI TEHNICE

Potențial de producție	ridicat
Calitatea producției	
Tipul spicului	nearistat, mediu-lung, lax
Înspicare	semi-timpurie
Maturitate	semi-timpurie
Înălțimea plantei	joasă / 60 - 75 cm
Capacitate de înfrățire	medie
Număr de boabe în spic	foarte mare
Masa a o mie de boabe (grame)	mare
Masa hectolitrică (kg/hl)	mare
Conținut de proteină	mediu
Gluten	mediu
Indice de sedimentare	bun
Indice de cădere	bun
Capacitate de absorbție a apei	medie
Stabilitatea aluatului	foarte bună
Volum aluat	mediu-ridicat
Grupa de calitate a aluatului	A

FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ


Toleranța față de ger	medie
Rezistența la înclinare și cădere	foarte bună
Rezistența la încolțirea în spic	bună
Toleranța față de Blumeria (făinare)	medie
Toleranța față de P. striif. (rugină galbenă)	bună
Toleranța față de P. rec. (rugină brună)	medie
Toleranța față de Septoria t.	medie
Toleranța față de Fusarium	medie

Pentru rezultate de producție superioare și un management integrat al combaterii bolilor și daunatorilor se recomandă respectarea asolamentului și aplicarea dozelor omologate a produselor de uz fitosanitar (în conformitate cu prevederile din ediția actualizată a CODEX ului).

Cu același scop recomandăm aplicarea a 2 tratamente fungicide cu rol preventiv precum și utilizarea produselor cu rol biostimulator și de nutriție în funcție de carente și necesități.

AMICUS

Rezultate de producție



CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări	Recomandat în toate zonele de cultură a grâului.
Potențial productiv în zone aride	f. ridicat
Potențial productiv în zone umede	mediu-ridicat
Norma de semănaare	400 - 500 b.g./mp

Cel mai bun rezultat

10800 kg/ha
STAS

Tehnologia aplicată: Cultura premergătoare: rapiță de toamnă

Prelucrarea terenului: disc greu după recptare

Pregătirea patului germinativ: disc greu în data de 28 septembrie

Data semamantului: 01 octombrie 2018

Tratamente fitosanitare: 20 octombrie: 62.5 g/ha deltametrin + 200 g/ha tebuconazole + aminoacizi 28 martie: 5g/ha Florasulam + 45 g/ha pinoxaden + 900 g/ha clorura de clomequat 20 aprilie: 32 g/ha protioconazol + 135 g/ha spiroxamină + 90 g/ha tebuconazol + aminoacizi + 25 g/ha acetamiprid 15 mai: 100 g/ha azoxistrobină + 40 g/ha ciproconazol + 25 g/ha acetamiprid

Recoltare: 15 iulie

Umiditatea recoltare: 14.2 %

MHL: 75 kg/hl

DAN FLOREA

Director zonal de vânzări

Cluj, Mureș, Harghita, Covasna,
Brașov, Sibiu, Huneadoara, Alba

+40 (0)75 701 3954
dan.florea@donausaat.com

NICOLETA BOGHICI

Director zonal de vânzări

Dolj, Olt, Gorj, Valcea, Mehedinți

+40 (0)75 116 9840
nicoleta.boghici@donausaat.com

MIHAI VINTU

Director zonal de vânzări

Botosani, Suceava, Iasi, Neamț,
Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați

+40 (0)75 701 3953
mihai.vintu@donausaat.com

ALEXANDRU POSCAS

Calarasi, Ialomita, Constanta, Tulcea,
Braila, Buzau

+40 (0)763 670 053
alexandru.poscas@donausaat.com

ANDREI BOSZORMENYI

Timis, Caras-Severin, Arad, Bihor,
Satu Mare

+40 (0)722 294 217
andrei.boszormenyi@donausaat.com

DONAU SAAT ROMANIA

Teleorman, Giurgiu, Arges, Dambovita,
Prahova, Ilfov

+40 (0)74 569 7455
office@donausaat.com,