

FLORASUN

Semi-tardiv | Tehnologie IMI



- Hibrid de generație nouă de mare productivitate
- Pachet foarte bun de toleranță față de principalele boli ale florii soarelui
- Foarte bună stabilitate a producțiilor inclusiv în zonele de cultură infestate cu Orobancha spp.



CARACTERISTICI MORFOLOGICE SI TEHNICE

Precocitatea înfloririi	mijlocie
Precocitatea recoltării	semi-tardiv
Perioada de vegetație până la maturitate (nr. zile de la răsărire)	122 - 124 zile
Număr de zile până la înflorire (nr. zile de la răsărire)	63-65 zile
Înălțimea plantei	medie-înaltă / 210 cm
Diametrul calatidiului (cm)	20
Forma calatidiului	usor convexă
Poziția calatidiului	aplecat cu tija dreapta
Masa hectolitră (kg/hl)	43
Masa a o mie de boabe (grame)	49
Conținut de ulei (%)	36-41
Conținut de acid oleic	scăzut

FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Vigoare la pomirea în vegetație	foarte bună
Toleranța față de secetă	foarte bună
Rezistența la înclinare și frângere	bună
Rezistența la frângerea tije sub calatidiu	medie-slabă
Rezistența la scuturare	foarte bună
Potențial de producție	foarte ridicat
Toleranța față de Plasmopara (infecție primară)	foarte bună
Toleranța față de Plasmopara (infecție secundară)	foarte buna
Toleranța față de Sclerotiniala calatidiu	foarte buna
Toleranța față de Sclerotiniala colet	foarte buna
Toleranța față de Phomopsis	scazuta
Toleranța față de Botrytis	foarte buna
Toleranța față de Orobancha Spp. (Lupoaie)	medie

Pentru rezultate de producție superioare și un management integrat al combaterii bolilor și daunătorilor se recomandă respectarea asolamentului și aplicarea dozelor omologate a produselor de uz fitosanitar (în conformitate cu prevederile din ediția actualizată a CODEX ului).

Cu același scop recomandăm aplicarea a 2 tratamente fungicide cu rol preventiv precum și utilizarea produselor cu rol biostimulator și de nutriție în funcție de carente și necesități.

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări Recomandat în toate zonele de cultură a florii soarelui inclusiv în zonele infestate cu Orobancha spp. cu condiția aplicării s.a. imazamox cu doza completă în stadiul de 6-8 funze al florii soarelui

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Tehnologia de cultură Compatibil cu tehnologia de erbicidare cu s.a. imazamox.

Norma de semănare
în condiții de neirigat 50.000 - 55.000 plante / ha

Norma de semănare
în condiții de irigat 60.000 - 65.000 plante / ha

DAN FLOREA

Director zonal de vanzari

Cluj, Mures, Harghita, Covasna,
Brasov, Sibiu, Huneadoara, Alba

+40 (0)75 701 3954
dan.florea@donausaat.com

NICOLETA BOGHICI

Director zonal de vanzari

Dolj, Olt, Gorj, Valcea, Mehedinti

+40 (0)75 116 9840
nicoleta.boghici@donausaat.com

MIHAI VINTU

Director zonal de vanzari

Botosani, Suceava, Iasi, Neamt,
Vaslui, Bacau, Vrancea, Galati

+40 (0)75 701 3953
mihai.vintu@donausaat.com

DONAU SAAT ROMANIA

Teleorman, Giurgiu, Arges, Dambovita,
Prahova, Ilfov

+40 (0)74 569 7455
office@donausaat.com,