

# INKASUN IR

Maturitate semitardiva | Tehnologie IMI



- Foarte buna toleranță față de Botrytis și Sclerotinia la calatidiu
- Hibrid de generație nouă recomandat pentru sisteme de producție intensivă
- Foarte bună stabilitate a producțiilor inclusiv în zonele de cultură infestate cu Orobanche spp.



## CARACTERISTICI MORFOLOGICE SI TEHNICE

Precocitatea înfloririi	mijlocie
Precocitatea recoltării	semi-tardiv
Perioada de vegetație până la maturitate (nr. zile de la răsărire)	122 - 124 zile
Număr de zile până la înflorire (nr. zile de la răsărire)	63-65 zile
Înălțimea plantei	medie-înaltă / 220 cm
Diametrul calatidiului (cm)	24
Forma calatidiului	pronunțat convexă
Poziția calatidiului	aplecat cu tija curbată
Masa hectolitră (kg/hl)	41
Masa a o mie de boabe (grame)	62
Conținut de ulei (%)	37-41
Conținut de acid oleic	scăzut

## FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Vigoare la pomirea în vegetație	foarte bună
Toleranța față de secetă	foarte bună
Rezistența la înclinare și frângere	foarte bună
Rezistența la frângerea tije sub calatidiu	buna
Rezistența la scuturare	bună
Potențial de producție	ridicat
Toleranța față de Plasmopara (infecție primară)	foarte bună
Toleranța față de Plasmopara (infecție secundară)	foarte buna
Toleranța față de Sclerotiniala calatidiu	foarte buna
Toleranța față de Sclerotiniala colet	buna
Toleranța față de Phomopsis	medie
Toleranța față de Botrytis	foarte buna
Toleranța față de Orobanche Spp. (Lupoaie)	nerezistent

Pentru rezultate de producție superioare și un management integrat al combaterii bolilor și daunatorilor se recomandă respectarea asolamentului și aplicarea dozelor omologate a produselor de uz fitosanitar (în conformitate cu prevederile din ediția actualizată a CODEX ului).

Cu același scop recomandăm aplicarea a 2 tratamente fungicide cu rol preventiv precum și utilizarea produselor cu rol biostimulator și de nutriție în funcție de carente și necesități.

## CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări      Recomandat în toate zonele de cultură a florei soarelui inclusiv în zonele infestate cu Orobanche spp. cu condiția aplicării s.a. imazamox cu doza completă în stadiul de 6-8 funze al florei soarelui

## CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

---

Tehnologia de cultură Compatibil cu tehnologia de erbicidare cu s.a. imazamox.

Norma de semănare  
în condiții de neirigat 50.000 - 55.000 plante / ha

Norma de semănare  
în condiții de irigat 60.000 - 65.000 plante / ha

---

### DAN FLOREA

Director zonal de vanzari

Cluj, Mures, Harghita, Covasna,  
Brasov, Sibiu, Huneadoara, Alba

+40 (0)75 701 3954  
dan.florea@donausaat.com

### NICOLETA BOGHICI

Director zonal de vanzari

Dolj, Olt, Gorj, Valcea, Mehedinti

+40 (0)75 116 9840  
nicoleta.boghici@donausaat.com

### MIHAI VINTU

Director zonal de vanzari

Botosani, Suceava, Iasi, Neamt,  
Vaslui, Bacau, Vrancea, Galati

+40 (0)75 701 3953  
mihai.vintu@donausaat.com

### DONAU SAAT ROMANIA

Teleorman, Giurgiu, Arges, Dambovita,  
Prahova, Ilfov

+40 (0)74 569 7455  
office@donausaat.com