

MONROE

Semitardiv | Orz toamnă (malț)

- Din recoltele de MONROE este alimentata cu malț întreaga producție a berii Gösser
- Este principalul soi de orz pentru bere propus de Donau Saat datorita unei adaptări pedo-climatice foarte bună exprimată prin constanța producțiilor din fermele unde a fost cultivat.

CARACTERISTICI MORFOLOGICE SI TEHNICE

Potențial de producție	ridicat
Tipul spicului	aristat, compact
Înspicare	semi-tardiva
Maturitate	semi-tardivă
Înălțimea plantei	medie-joasă / 65-80 cm
Capacitate de înfrățire	mare
Număr de boabe în spic	mare
Masa a o mie de boabe (grame)	mediu
Masa hectolitrică (kg/hl)	medie
Calibraj (boabe > 2.2 mm)	mare
Calibraj (boabe < 2.5 mm)	ridicat
Conținut de proteină	mediu
Conținut de fibră	mare


FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Toleranța față de ger	medie-joasă
Rezistența la înclinare și cădere	medie
Rezistența la frângere	medie-bună
Rezistența la căderea spicelor	medie
Toleranța față de Blumeria (făinare)	medie
Toleranța față de BYDV (virusul piticirii)	mediu-slaba
Toleranța față de BYMV (virusul mozaic)	foarte bună
Toleranța față de Monographella n. (mucegaiul zăpezii)	medie
Toleranța față de rugini	mediu-slaba
Toleranța față de Pyrenophora (pătarea reticulară)	mediu-slaba
Toleranța față de Rhynchosporium (arsura frunzelor)	bună
Toleranța față de Ramularia	mediu-slaba

Pentru rezultate de productie superioare si un management integrat al combaterii bolilor si daunatorilor se recomanda respectarea asolamentului si aplicarea dozelor omologate a produselor de uz fitosanitar (in conformitate cu prevederile din editia actualizata a CODEX ului).

Cu acelasi scop recomandam aplicarea a 2 tratamente fungicide cu rol preventiv precum si utilizarea produselor cu rol biostimulator si de nutritie in functie de carente si necesitati.

MONROE



Surse:
rețeaua de testare proprie a Donau Saat
centre oficiale de testare a soiurilor

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări Recomandat in toate zonele de cultură a orzului. Pentru încadrarea în parametrii de malțificare trebuie reduse aporturile de N. Semănatul optim se poate încadra în ultima decadă din septembrie respectiv până în prima decadă din octombrie.

Norma de semănare 300 - 380 b.g./mp

DAN FLOREA

Director zonal de vanzari

Cluj, Mures, Harghita, Covasna,
Brasov, Sibiu, Huneadoara, Alba

+40 (0)75 701 3954
dan.florea@donausaat.com

NICOLETA BOGHICI

Director zonal de vanzari

Dolj, Olt, Gorj, Valcea, Mehedinti

+40 (0)75 116 9840
nicoleta.boghici@donausaat.com

MIHAI VINTU

Director zonal de vanzari

Botosani, Suceava, Iasi, Neamt,
Vaslui, Bacau, Vrancea, Galati

+40 (0)75 701 3953
mihai.vintu@donausaat.com

ALEXANDRU POSCAS

Calarasi, Ialomita, Constanta, Tulcea,
Braila, Buzau

+40 (0)76 367 0053
alexandru.poscas@donausaat.com

ANDREI BOSZORMENYI

Timis, Caras-Severin, Arad, Bihor,
Satu Mare

+40 (0)72 229 4217
andrei.boszormenyi@donausaat.com

DONAU SAAT ROMANIA

Teleorman, Giurgiu, Arges, Dambovita,
Prahova, Ilfov

+40 (0)74 569 7455
office@donausaat.com