

UNOSUN

Semitardiv | Tehnologie SU

- Hibrid de generație nouă cu producții constante peste medie
- Foarte bună toleranță față de principalele boli
- Foarte buna rezistență la frângere și cădere
- Răspunde favorabil în condiții de tehnologie intensivă

CARACTERISTICI MORFOLOGICE SI TEHNICE

Precocitatea înflorii	semi-tardiv
Precocitatea recoltării	semi-tardiv
Perioada de vegetație până la maturitate (nr. zile de la răsărire)	123 - 126 zile
Număr de zile până la înflorire (nr. zile de la răsărire)	67-70 zile
Înălțimea plantei	medie / 190 - 210 cm
Diametrul calatidiului (cm)	21
Forma calatidiului	pronunțat convexă
Poziția calatidiului	aplecat cu tija ușor curbată
Masa hectolitrică (kg/hl)	35-41
Masa a o mie de boabe (grame)	58-65
Conținut de ulei (%)	37-43
Conținut de acid oleic	scăzut

FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Vigoare la pomirea în vegetație	foarte bună
Toleranța față de secetă	foarte bună
Rezistența la înclinare și frângere	foarte bună
Rezistența la frângerea tije sub calatidiu	foarte buna
Rezistența la scuturare	foarte bună
Potențial de producție	ridicat
Toleranța față de Plasmopara (infecție primară)	bună
Toleranța față de Plasmopara (infecție secundară)	f. slabă
Toleranța față de Sclerotiniala calatidiu	buna
Toleranța față de Sclerotiniala colet	foarte buna
Toleranța față de Phomopsis	bună
Toleranța față de Botrytis	foarte buna
Toleranța față de Orobanchae Spp. (Lupoaie)	mediu-rez.

Pentru rezultate de producție superioare și un management integrat al combaterii bolilor și daunătorilor se recomandă respectarea asolamentului și aplicarea dozelor omologate a produselor de uz fitosanitar (în conformitate cu prevederile din ediția actualizată a CODEX ului).

Cu același scop recomandăm aplicarea a 2 tratamente fungicide cu rol preventiv precum și utilizarea produselor cu rol biostimulator și de nutriție în funcție de carente și necesități.

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări	Recomandat în toate zonele de cultură a florei soarelui cu excepția celor infestate cu Orobanchae spp.
Tehnologia de cultură	Compatibil cu tehnologia de erbicidare cu s.a. tribenuron-metil hibrid homozigot
Norma de semănare în condiții de neirigat	50.000 - 55.000 plante / ha
Norma de semănare în condiții de irigat	60.000 - 65.000 plante / ha

DAN FLOREA

Director zonal de vanzari

Cluj, Mures, Harghita, Covasna,
Brasov, Sibiu, Huneadoara, Alba

+40 (0)75 701 3954
dan.florea@donausaat.com

NICOLETA BOGHICI

Director zonal de vanzari

Dolj, Olt, Gorj, Valcea, Mehedinti

+40 (0)75 116 9840
nicoleta.boghici@donausaat.com

MIHAI VINTU

Director zonal de vanzari

Botosani, Suceava, Iasi, Neamt,
Vaslui, Bacau, Vrancea, Galati

+40 (0)75 701 3953
mihai.vintu@donausaat.com

DONAU SAAT ROMANIA

Teleorman, Giurgiu, Arges, Dambovita,
Prahova, Ilfov

+40 (0)74 569 7455
office@donausaat.com