



DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO



CATALOG PRODUSE

2024



PENTRU HECTARUL TĂU DE
NOTĂ
10





DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO

Suntem încântați să vă anunțăm că, în acest an, Donau Saat marchează un moment deosebit: aniversarea a 10 ani de activitate și dedicare în domeniul agricol. Cu această ocazie specială, avem plăcerea de a vă oferi un material exclusiv, care scoate în evidență cele mai importante varietăți din portofoliul nostru. Acești hibrizi și soiuri, pe care le prezentăm, au trecut cu succes testele practice în producția vegetală, dovedindu-și eficiența inițial pe suprafețe restrânse, urmată de o implementare de succes în fermele care le-au adoptat în culturile extinse.

Cu prilejul aniversării celor 10 ani de activitate am ales să realizăm o ediție aniversară tipărită în tiraj limitat.

În completarea acestei ediții, vă invităm să vizitați www.binealegibineculegi.ro, care oferă acces la o gamă largă de resurse și informații detaliate.

Varietățile prezentate în acest material, cuprind specii cheie din portofoliul nostru și reprezintă doar o frântură din bogăția genetică pe care Donau Saat o poate pune la dispoziția dumneavoastră. Pe lângă culturile tradiționale, veți descoperi semințe pentru culturi de nișă și diverse forme de certificare, toate proiectate pentru a maximiza randamentele și profiturile fermelor dumneavoastră.

Cu un portofoliu atât de variat și diversificat, suntem convinși că fiecare dintre partenerii noștri va găsi soluția optimă pentru a obține rezultate profitabile.

Vă mulțumim că ne-ați fost alături în acești 10 ani remarcabili!



DONAU SAAT



BINEALEGIBINECULEGI.RO

FLOAREA SOARELUI CU TOLERANȚĂ FAȚĂ DE ERBICIDE PE BAZĂ DE TRIBENURON METIL

SOFIASOL.....	10
HELESUN SU.....	11
BRAVOSUN.....	12

FLOAREA SOARELUI CU TOLERANȚĂ FAȚĂ DE ERBICIDE PE BAZĂ DE IMAZAMOX

JONASUN.....	14
IRINASOL.....	15

PORUMB

PIRRO (FAO 210).....	18
ATLANTICO (FAO 250).....	19
DANUBIO (FAO 260).....	20
ARDENNO (FAO 320).....	21
ESTEVIO (FAO 350).....	22
ANTARO (FAO 360).....	23
DOBROTO (FAO 360).....	24
ARTENYO (FAO 360).....	25
ARCADIO (FAO 380).....	26

SOLITARO (FAO 380).....	27
MULTIPEL (FAO 400).....	28
ARSANTTO (FAO 410).....	29
KATEDRALL (FAO 440).....	30
AGROKING (FAO 510).....	31

SOIA

SY LIVIUS.....	34
AMIATA.....	35
ADELFA.....	36
ABACA.....	37
ANGELICA.....	38
ATANGA.....	39
APOLLINA.....	40

CEREALE DE PRIMĂVARĂ, CULTURI SPECIALE

GRANNY (GRÂU).....	44
WILMA (ORZOAICĂ).....	44
PROCOP (OVĂZ).....	45
OMEGALIN (IN).....	45
CLEOPATRA (RAPIȚĂ).....	46
CARNELA (MUȘTAR).....	46
BIORRO (BOB).....	47



CUPRINS

SPECII ȘI AMESTECURI FURAJERE

GRUNLANDPROFI KB.....	50
GRUNLANDPROFI EB.....	51
GRUNLANDPROFI PS.....	52
REICHERSBERGER.....	53
FUTTERPROFI LR.....	54
FUTTERPROFI KM.....	55
FUTTERPROFI EI.....	56
BUSOLA ALEGERII AMESTECURILOR PENTRU PĂȘUNI.....	57
CATEGORIILE AMESTECURILOR CU SEMINȚE PENTRU PĂȘUNI ȘI FURAJARE.....	58

COVOARE VEGETALE

BODENFIT.....	62
NITROFIT.....	62
WINTERFIT.....	63

RAPIȚĂ DE TOAMNĂ

PIROL.....	66
KENTUCKY.....	67
ASTANA.....	68
TATIANA.....	69

CEREALE PĂIOASE TOAMNĂ

APEXUS (GRÂU).....	72
AMICUS (GRÂU).....	73
CSIKO (GRÂU).....	74
GUIDO (GRÂU).....	75
CHEVIGNON (GRÂU).....	76
PARACELSUS (SPELTA).....	77
ADALINA (ORZ).....	79
SUEZ (ORZOAICĂ).....	80
LENTIA (ORZOAICĂ).....	81
TRIBONUS (TRITICALE).....	82
DUKATO (SECARĂ).....	83
PREZENTAREA PORTOFOLIULUI ÎN CÂMPURILE EXPOZIȚIONALE ÎN 2024.....	84

REȚEA COMERCIALĂ

.....	86
-------	----



Fiecare poveste are un început, iar povestea noastră a debutat acum 10 ani, când două companii de renume în domeniu, Saatbau Linz și Probstdorfer SaatZucht, au hotărât să-și unească forțele și să investească în viitorul agriculturii românești. Astfel a luat naștere Donau Saat România, o echipă unită de oameni cu inimă mare și specialiști pasionați, cărora le-au împărtășit viziunea de a progresa în agricultură.

În spatele cuvintelor mari stau fapte cotidiene, palpabile și vii, trăite aici, la noi, în familia Donau Saat. Acestea nu sunt nu doar vorbe goale, ci realitatea pe care o construim zi de zi cu multă muncă și dedicare. Fructul acestei munci începe să se vadă în numărul tot mai mare al clienților noștri fideli, ce își pun încrederea în performanțele geneticii noastre.

Si astfel cu o deosebită bucurie și mândrie sărbătorim cea de-a zecea aniversare a Donau Saat, un deceniu dedicat progresului și realizărilor. În această perioadă am parcurs un drum deloc ușor, care prin angajament și inovații au contribuit în dezvoltarea portofoliului nostru și implicit a dezvoltării parteneriatelor.

Unul dintre pilonii evoluției noastre de-a lungul acestor 10 ani a fost ameliorarea hibrizilor de floarea soarelui față boli ori *Orobanche spp.* și nu numai. Prin cercetare și dezvoltare continuă, am reușit să dobândim hibrizi valoroși, care formează astăzi un portofoliu de înaltă calitate capabil nu doar să reziste dar să și aduca producții însemnate în toate zonele de cultură.



CUVÂNT-ÎNAINTE

În același timp suntem onorați să oferim soiuri de grâu de toamnă extrem de productive pentru condițiile din ce în ce mai aride de cultură. Aceste soiuri aduc în primul rând siguranță agricultorilor însă în același timp sunt capabile să asigure indici calitativi superiori.

Un alt aspect esențial pe care îl marcăm cu această aniversare este angajamentul nostru față de economia locală.

Prin producerea și condiționarea de semințe certificate în colaborare cu entități din România, Donau Saat contribuie direct la sprijinirea comunităților locale și la consolidarea parteneriatelor durabile în România.

Calitate, tradiție și efort sunt cuvinte ce definesc ADN-ul nostru. Dar, mai presus de toate, respectul rămâne o valoare de bază. Respectăm clienții noștri, indiferent de locație, dimensiunea fermelor sau nivelul tehnologic. Fie că sunt fermieri mici sau mari, ne străduim să fim aproape de ei, oferindu-le soluții agronomice și agrotehnice de calitate.

În final, vrem să transmitem sincere mulțumiri tuturor celor implicați în această călătorie extraordinară – fermierilor, partenerilor de afaceri, colaboratorilor și, desigur, echipei noastre dedicate. Cu pasiune și inovație, am reușit să construim împreună un parcurs de succes și suntem pregătiți pentru provocările viitoare.

**CU GRATITUDINE,
ECHIPA DONAU SAAT ROMÂNIA.**



DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO

FLOAREA SOARELUI





DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO

**Gama de hibrizi de ultimă generație
adaptată unor condiții variate de
cultură**

FLOAREA SOARELUI CU TOLERANȚĂ FAȚĂ DE ERBICIDE PE BAZĂ DE TRIBENURON METIL

_____	SOFIASOL		
_____	HELESUN SU		
_____	BRAVOSUN		

PROMOȚIE

Toți producătorii agricoli care achiziționează minim 10 saci cu sămânță de floarea soarelui din oferta Donau Saat sunt recompensați cu **al 11-lea sac oferit cu titlu gratuit** conform ofertei comerciale în vigoare.





Sofiasol

NOU

KLIMAFIT

SEMI-TIMPURIU

- ✓ Hibrid de ultimă generație tolerant față de erbicide pe bază de tribenuron metil.
- ✓ Talie mediu-înaltă cu foliaj compact cu bună toleranță față de frângere dată de toleranța față de *Sclerotinia* și *Phomopsis*.
- ✓ Asigură producții bune în condiții dificile și dobândește sporuri însemnate în condiții de favorabilitate sporită.



FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Vigoare la pornirea în vegetație	foarte bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐
Toleranța față de secetă	foarte bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐
Rezistența la înclinare și frângere	foarte bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐
Rezistența la frângerea tije sub calatidiu	bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Rezistența la scuturare	foarte bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐
Potențial de producție	foarte ridicat	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐
Toleranța față de <i>Plasmopara</i> (infecție primară)	bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Toleranța față de <i>Plasmopara</i> (infecție secundară)	medie	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Toleranța față de <i>Sclerotinia</i> calatidiu	bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Toleranța față de <i>Sclerotinia</i> colet	bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Toleranța față de <i>Phomopsis</i>	slabă	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Toleranța față de <i>Botrytis</i>	bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Toleranța față de <i>Orobanche Spp.</i> (Lupoaie)	mediu-slabă	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Precocitatea înfloririi	semi-timpurie	Înălțimea plantei	medie / 170 - 195 cm	Masa hectolitică (kg/hl)	40-42
Precocitatea recoltării	semi-timpurie	Diametrul calatidiului	22-24 cm	Masa la o mie de boabe (grame)	50-58
Perioada de vegetație până la maturitate (nr. zile de la răsărire)	115 - 122 zile	Forma calatidiului	ușor concav	Conținut de ulei (%)	44-46
Numar de zile pana la înflorire (nr. zile de la răsărire)	64 - 70 zile	Poziția calatidiului	semi aplecat cu tija dreaptă	Conținut de acid oleic	scăzut

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări

Recomandat în toate zonele de cultură a florei soarelui în afara celor infestate cu *Orobanche spp.*

Norma de semănare în condiții de neirigat


55.000 - 65.000 plante / ha

Tehnologia de cultură

Compatibil cu tehnologia de erbicidare cu s.a. tribenuron-metil

Norma de semănare în condiții de irigat

70.000 - 75.000 plante / ha



Legendă

- Rețeaua de testare proprie a Donau Saat și centre de testare a solurilor și hibrizilor
- Câmpuri demonstrative sau testare ale partenerilor



FLOAREA SOARELUI SU

Helesun SU

SEMI-TIMPURIU

- ✓ Hibrid de generație nouă.
- ✓ Foarte bună stabilitate a producțiilor în toate zonele de favorabilitate a culturii florii soarelui.
- ✓ Bună rezistență la cădere și frângere.
- ✓ Tolerantă bună față de mana florii soarelui.



FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Caracteristică	Clasă	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vigoare la pornirea în vegetație	foarte bună	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța față de secetă	foarte bună	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□
Rezistența la înclinare și frângere	foarte bună	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Rezistența la frângerea tije sub calatidiu	bună	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□
Rezistența la scuturare	foarte bună	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□
Potențial de producție	foarte ridicat	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța față de <i>Plasmopara</i> (infecție primară)	bună	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța față de <i>Plasmopara</i> (infecție secundară)	medie	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□
Toleranța față de <i>Sclerotinia</i> la calatidiu	mediu-slabă	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□
Toleranța față de <i>Sclerotinia</i> la colet	bună	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
Toleranța față de <i>Phomopsis</i>	medie	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□
Toleranța față de <i>Botrytis</i>	bună	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța față de <i>Orobanche Spp.</i> (Lupoaie)	bună	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Precocitatea înfloririi	semi-timpurie	Înălțimea plantei	medie / 170 - 210 cm	Masa hectolitrică (kg/hl)	43
Precocitatea recoltării	semi-timpurie	Diametrul calatidiului	20 cm	Masa la o mie de boabe (grame)	60
Perioada de vegetatie până la maturitate (nr. zile de la răsărire)	113-121 zile	Forma calatidiului	ușor concav	Conținut de ulei (%)	40-44,7
Numar de zile pana la înflorire (nr. zile de la răsărire)	58-64 zile	Poziția calatidiului	semi aplecat cu tija dreaptă	Conținut de acid oleic	scăzut

CARATTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare si recomandări

Recomandat în toate zonele de cultură a florii soarelui inclusiv în cele infestate cu *Orobanch* spp. până la rasa E

Norma de semănare în condiții de neirigat


55.000 - 65.000 plante / ha

Tehnologia de cultură

Compatibil cu tehnologia de erbicidare cu s.a. tribenuron-metil


Norma de semănare în condiții de irigat

70.000 - 75.000 plante / ha



Legendă

- Rețeaua de testare proprie a Donau Saat și centre de testare a solurilor și hibrizilor
■ Câmpuri demonstrative sau testare ale partenerilor





DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO

**Gama de hibrizi de ultimă generație
adaptată unor condiții variate de
cultură**

**FLOAREA SOARELUI CU TOLERANȚĂ
FAȚĂ DE ERBICIDE PE BAZĂ DE
IMAZAMOX**



IRINASOL



JONASUN



PROMOȚIE

Toți producătorii agricoli care achiziționează minim 10 saci cu sămânță de floarea soarelui din oferta Donau Saat sunt recompensați cu **al 11-lea sac oferit cu titlu gratuit** conform ofertei comerciale în vigoare.






DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO



- ✓ Hibrid de noua generație pentru sistemul de erbicidare cu produse cu substanța activă pe bază de imazamox
- ✓ Beneficiază de unul din cele mai mari grade a plasticității ecologice din tot portofoliul.
- ✓ Recomandat pentru toate zonele de cultură a florii soarelui, în special în regiunile cu infestare de *Orobancha* spp.
- ✓ Toleranța bună față de principalele boli ale florii soarelui.



- Vigoare la pornirea în vegetație
- Toleranța față de secetă
- Rezistența la înclinare și frângere
- Rezistența la frângerea tije sub calatidiu
- Rezistența la scuturare
- Potențial de producție
- Toleranța față de *Plasmopara* (infecție primară)
- Toleranța față de *Plasmopara* (infecție secundară)
- Toleranța față de *Sclerotiniala* calatidiu
- Toleranța față de *Sclerotiniala* colet
- Toleranța față de *Phomopsis*
- Toleranța față de *Botrytis*
- Toleranța față de *Orobanche Spp.* (Lupoaie)



Precocitatea înfloririi	semi-timpurie
Precocitatea recoltării	timpurie
Perioada de vegetatie până la maturitate (nr. zile de la răsărire)	103-108 zile
Numar de zile pana la înflorire (nr. zile de la răsărire)	62-64 zile

Înălțimea plantei	medie / 170 - 190 cm
Diametrul calatidiului	20-22 cm
Forma calatidiului	ușor convex
Pozitia calatidiului	semi aplecat cu tija dreaptă

Masa hectolitrică (kg/hl)	40
Masa la o mie de boabe (grame)	52
Conținut de ulei (%)	40
Conținut de acid oleic	scăzut

Zonare si recomandări

Recomandat în toate zonele de cultură a florei soarelui inclusiv în zonele infestate cu *Orobancha* spp. până la rasă E cu condiția aplicării s.a. imazamox cu doză completă în stadiul de 6-8 funze ale florei soarelui

Tehnologia de cultură



Compatibil cu tehnologia
de erbicidare cu s.a.
imazamox

Norma de semănare în condiții de neirigat

52.000 - 58.000 plante / ha

Norma de semănare în condiții de irigat

60.000 - 65.000 plante / ha



Legendă

- Rețeaua de testare proprie a Donau Saat și centre de testare a solurilor și hibrizilor
■ Câmpuri demonstrative sau testare ale partenerilor



Jonasun

NOU

SEMI-TIMPURIU

- ✓ Hibrid de noua generație pentru sistemul de erbicidare cu produse cu substanța activă pe bază de imazamox.
- ✓ Hibrid cu mare plasticitate ecologică capabil să obțină producții însemnate în condiții de favorabilitate cel puțin medie.
- ✓ Recomandat pentru toate zonele de cultură a florei soarelui, în special în regiunile cu infestare de Orobanche spp.



FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Vigoare la pornirea în vegetație	foarte bună	
Toleranța față de secetă	foarte bună	
Rezistența la înclinare și frângere	bună	
Rezistența la frângerea tije sub calatidiu	mediu-bună	
Rezistența la scuturare	bună	
Potențial de producție	ridicat	
Toleranța față de <i>Plasmopara</i> (infecție primară)	foarte bună	
Toleranța față de <i>Plasmopara</i> (infecție secundară)	medie	
Toleranța față de <i>Sclerotiniala</i> calatidui	bună	
Toleranța față de <i>Sclerotiniala</i> colet	mediu-slabă	
Toleranța față de <i>Phomopsis</i>	mediu-bună	
Toleranța față de <i>Botrytis</i>	bună	
Toleranța față de <i>Orobanche</i> Spp. (Lupoaie)	nerezistent	

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Precocitatea înfloririi	semi-timpurie	Înălțimea plantei	medie / 170-190 cm	Masa hectolitrică (kg/hl)	41
Precocitatea recoltării	semi-timpurie	Diametrul calatidiului	22-25 cm	Masa la o mie de boabe (grame)	52
Perioada de vegetație până la maturitate (nr. zile de la răsărire)	109-115 zile	Forma calatidiului	pronunțat convexă	Conținut de ulei (%)	40
Numar de zile pana la înflorire (nr. zile de la răsărire)	65-67 zile	Poziția calatidiului	aplecat cu tija curbată	Conținut de acid oleic	scăzut

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări


Recomandat în toate zonele de cultură a florei soarelui inclusiv în zonele infestate cu Orobanche spp. până la rasă E cu condiția aplicării s.a. imazamox cu doză completă în stadiul de 6-8 funze ale florei soarelui

Tehnologia de cultură

Compatibil cu tehnologia de erbicidare cu s.a. imazamox

Norma de semănare în condiții de neirigat
52.000 - 58.000 plante / ha

Norma de semănare în condiții de irigat
60.000 - 65.000 plante / ha



Legendă

- Rețeaua de testare proprie a Donau Saat și centre de testare a solurilor și hibrizilor
- Câmpuri demonstrative sau testare ale partenerilor



DONAU SAAT

BINEALEGIBINECULEGI.RO

PORUMB





DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO

Gama de hibrizi de ultimă generație adaptată unor condiții variate de cultură

PORUMB

— PIRRO (FAO 210)

— ATLANTICO (FAO 250)

— DANUBIO (FAO 260)

— ARDENNO (FAO 320)

— ESTEVIO (FAO 350)

— ANTARO (FAO 360)

— DOBROTO (FAO 360)

— ARTENYO (FAO 360)



— MULTIPEL (FAO 400)


— SOLITARO (FAO 380)

— ARCADIO (FAO 380)

— ARSANTTO (FAO 410)

— KATEDRALL (FAO 440)

— AGROKING (FAO 510)



PORUMB



Pirro

FAO 210

DENTAT



DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO



- ✓ Un hibrid capabil să obțină producție peste gurpe de maturitate din care face parte.
- ✓ Este caracterizat de o deosebită plasticitate ecologică și o mare versatilitate a utilizărilor: producție de boabe, biogaz sau furaj.
- ✓ Hibrid recomandat pentru cultura a doua în zonele din sudul și estul României.



FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Toleranță față de sfâșierea frunzelor (*Helminthosporium turcicum*)

medie-bună

Toleranță față de putregaiul tulpinilor (*Erwinia sp.*)

foarte bună

Toleranță față de taciunile comune (*Ustilago maydis*)

medie

Toleranță față de fuzarioza stiuiletilor (*Fusarium sp.*)

slabă

Rezistența la temperaturile scăzute din primăvară

foarte mare

Vigurozitate

foarte mare

Rezistența față de cădere

bună

Rezistența față de frângerea tulpinilor

bună

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Textura bobului

Dentiformis cu influențe puternice de îndurată

Nr de boabe pe rând

30-32

Utilizare

Recoltare boabe sau siloz plantă întreagă morărit/mălai; furajare boabe sau siloz

Nr. de rânduri de boabe

14-16

Masa a o mie de boabe (la recoltare)

340-380 g

Ritmul de creștere în primele faze de vegetație

foarte rapid

Nivelul caracterului "staygreen"

mediu-slab

Talia plantei

medie-joasă

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Pretabilitatea pentru siloz

bună

Densitate în condiții de irigat


65.000 - 70.000 boabe germinabile / ha

Densitate în condiții de neirigat

60.000 - 65.000 boabe germinabile / ha

Densitate pentru siloz

85.000 - 95.000 boabe germinabile / ha



Legendă

- Rețeaua de testare proprie a Donau Saat și centre de testare a solurilor și hibrizilor
- Câmpuri demonstrative sau testare ale partenerilor



- ✓ Atlantico este un hibrid de porumb timpuriu de generație nouă caracterizat de o creștere rapidă în primele faze de vegetație.
- ✓ Foarte bună adaptare în condiții de stress abiotic.
- ✓ Hibrid cu dublă utilizare pentru boabe sau siloz; foarte bun stay green.



FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Toleranță față de sfâșierea frunzelor (*Helminthosporium turcicum*)

medie

Toleranță față de putregaiul tulpinilor (*Erwinia sp.*)

bună

Toleranță față de taciunile comune (*Ustilago maydis*)

bună

Rezistența la temperaturile scăzute din primăvară

foarte bună

Vigurozitate

foarte bună

Rezistența față de cădere

foarte bună

Rezistența față de frângerea tulpinilor

foarte bună

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Textura bobului

Dentiformis

Utilizare

Recoltare boabe sau siloz plantă întreagă; furajare boabe sau siloz

Nr de boabe pe rând

34-38

Nr. de rânduri de boabe

12-16

Masa a o mie de boabe (la recoltare)

bună

Ritmul de creștere în primele faze de vegetație

foarte bună

Nivelul caracterului "staygreen"

foarte bună

Talia plantei

foarte bună

Înălțimea de inserție

medie

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Pretabilitatea pentru siloz

foarte mare

Densitate în condiții de irigat


70.000 - 80.000 boabe germinabile / ha

Densitate în condiții de neirigat

70.000 - 80.000 boabe germinabile / ha

Densitate pentru siloz

80.000 boabe germinabile/ha (zone cu 450-650 mm precip.)



Legendă

- Rețeaua de testare proprie a Donau Saat și centre de testare a solurilor și hibrizilor
- Câmpuri demonstrative sau testare ale partenerilor

PORUMB



Danubio

FAO 260

STICLOS



DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO



- ✓ Danubio este un hibrid de porumb trilinear cu o deosebită vigoare în primele faze de vegetație.
- ✓ Este un hibrid robust cu foarte bună adaptare pedoclimatică; poate performa inclusiv în areale mai răcoroase, cu desprimăvărare lentă.
- ✓ Prezintă un cumul de calitate sporite pentru utilizarea în furajare precum și pentru morărit (mălai) datorită caracterului sticlos al boabelor.



FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Toleranță față de sfâșierea frunzelor (*Helminthosporium turcicum*)

foarte bună

Toleranță față de putregaiul tulpinilor (*Erwinia sp.*)

foarte bună

Toleranță față de taciunile comune (*Ustilago maydis*)

bună

Toleranță față de fuzarioza stuletilor (*Fusarium sp.*)

mediu-bună

Rezistența la temperaturile scăzute din primăvară

foarte bună

Vigurozitate

bună

Rezistența față de cădere

bună

Rezistența față de frângerea tulpinilor

foarte bună

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Textura bobului

Indurată

Nr de boabe pe rând

34-36

Utilizare

Recoltare boabe sau siloz plantă întreagă morărit/mălai; furajare boabe sau siloz

Nr. de rânduri de boabe

12-14

Masa a o mie de boabe (la recoltare)

380-420 g

Ritmul de creștere în primele faze de vegetație

foarte rapid

Nivelul caracterului "staygreen"

slab

Talia plantei

foarte mare

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Pretabilitatea pentru siloz

foarte bună

Densitate în condiții de irigat


65.000 - 70.000 boabe germinabile / ha

Densitate în condiții de neirigat

60.000 - 65.000 boabe germinabile / ha

Densitate pentru siloz

90.000 - 95.000 boabe germinabile / ha



Legendă

- Rețeaua de testare proprie a Donau Saat și centre de testare a solurilor și hibrizilor
- Câmpuri demonstrative sau testare ale partenerilor



Ardenno

● **FAO 320** ● **DENTAT**

- ✓ Compact și uniform.
- ✓ Planta cu maturare uniformă, pierde rapid apa la maturitatea fiziologică.
- ✓ Hibrid foarte bine adaptat condițiilor de cultură din țara noastră, cu rezultate bune și constante în diferite condiții de cultură.



FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Toleranță față de sfâșierea frunzelor (*Helminthosporium turcicum*)

medie-bună 

Toleranță față de putregaiul tulpinilor (*Erwinia sp.*)

foarte bună 

Toleranță față de fuzarioza stiuletilor (*Fusarium sp.*)

medie-bună 

Rezistența la temperaturile scăzute din primăvară

bună 

Vigurozitate

bună 

Rezistența față de cădere

foarte bună 

Rezistența față de frângerea tulpinilor

bună 

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Textura bobului

Dentiformis

Nr de boabe pe rând

32-34

Utilizare

Recoltare boabe, furajare boabe

Nr. de rînduri de boabe

16-18

Masa a o mie de boabe (la recoltare)

380-420 g 

Ritmul de creștere în primele faze de vegetație

rapid 

Nivelul caracterului "staygreen"

mediu 

Talia plantei

mediu-joasă 

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Pretabilitatea pentru siloz


scăzută 

Densitate în condiții de irigat

70.000 - 80.000 boabe germinabile / ha

Densitate în condiții de neirigat

60.000 - 70.000 boabe germinabile / ha



Legendă

-  Rețeaua de testare proprie a Donau Saat și centre de testare a solurilor și hibrizilor
-  Câmpuri demonstrative sau testare ale partenerilor

PORUMB



DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO

Estevio

● **FAO 350** ● **DENTAT**

- ✓ Hibrid de generație nouă cu habitus compact și destinat producției de boabe
- ✓ Foarte bună adaptare în special în condiții aride de cultură și în areale cu potențial redus datorită factorilor pedologici
- ✓ Reacționează foarte bine față de densitățile sporite cu 5 până la 10%



FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Toleranță față de sfâșierea frunzelor (*Helminthosporium turcicum*)

bună         

Toleranță față de taciunile comune (*Ustilago maydis*)

foarte bună         

Toleranță față de fuzarioza stiuilelor (*Fusarium sp*)

foarte bună         

Rezistența la temperaturile scăzute din primăvară

bună         

Vigurozitate

bună         

Rezistența față de cădere

foarte bună         

Rezistența față de frângerea tulpinilor

foarte bună         

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Textura bobului

Dentiformis

Utilizare

Recoltare boabe, furajare boabe

Talia plantei

Înălțimea de inserție

Nr de boabe pe rând

34-38

Nr. de rânduri de boabe

16-18

medie         

medie-înaltă         

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Adaptarea la densități ridicate


foarte bună         

Densitate în condiții de irigat

70.000 - 80.000 boabe germinabile / ha

Densitate în condiții de neirigat

60.000 - 70.000 boabe germinabile / ha



Legendă

-  Rețeaua de testare proprie a Donau Saat și centre de testare a solurilor și hibrizilor
-  Câmpuri demonstrative sau testare ale partenerilor

Antaro

● **FAO 360** ● **DENTAT**

- ✓ Un hibrid de încredere întotdeauna și pretutindeni
- ✓ Hibrid deosebit de productiv recomandat pentru tehnologiile intensive de cultură.
- ✓ Una din cele mai ridicate plasticități ecologice între hibrizii din portofoliu.



FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Toleranță față de sfâșierea frunzelor (*Helminthosporium turcicum*)

medie-bună

Toleranță față de putregaiul tulpinilor (*Erwinia sp.*)

mediu-slabă

Rezistența la temperaturile scăzute din primăvară

bună

Vigurozitate

foarte bună

Rezistența față de cădere

bună

Rezistența față de frângerea tulpinilor

mediu-bună

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Textura bobului

Dentiformis

Utilizare

Recoltare boabe, furajare boabe

Masa a o mie de boabe (la recoltare)

Ritmul de creștere în primele faze de vegetație

Nivelul caracterului "staygreen"

Talia plantei

Nr de boabe pe rând

35-38

Nr. de rânduri de boabe

18-20

300-340 g

foarte rapid

mediu

medie-joasă

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Pretabilitatea pentru siloz


scăzută

Densitate în condiții de irigat

70.000 - 80.000 boabe germinabile / ha

Densitate în condiții de neirigat

60.000 - 70.000 boabe germinabile / ha



Legendă

- Rețeaua de testare proprie a Donau Saat și centre de testare a solurilor și hibrizilor
- Câmpuri demonstrative sau testare ale partenerilor

PORUMB



Dobroto

● **FAO 360** ● **DENTAT**



DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO



- ✓ Hibrid robust, cu toleranță crescută la condițiile de stres, în special seceta;
- ✓ Platicitate ecologică deosebită, excelent adaptat diferitelor condiții de cultură și cu rezultate constante, chiar și pe soluri mai sărace și cu aplicarea unei tehnologii conservatoare;
- ✓ Dobroto este un hibrid cu dubla utilizare pentru boabe și/sau siloz.



FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Toleranță față de sfâșierea frunzelor (*Helminthosporium turcicum*)

mediu-bună ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

Toleranță față de putregaiul tulpinilor (*Erwinia sp.*)

foarte bună ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐

Toleranță față de taciunile comune (*Ustilago maydis*)

bună ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

Toleranță față de fuzarioza stietilor (*Fusarium sp.*)

bună ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

Rezistența față de cădere

foarte bună ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐

Rezistența față de frângerea tulpinilor

bună ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Textura bobului

Dentiformis

Utilizare

Recoltare boabe sau siloz plantă întreagă: furajare boabe sau siloz

Nr de boabe pe rând

34-36

Nr. de rânduri de boabe

14-16

Masa a o mie de boabe (la recoltare)

380-420 g ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐

Ritmul de creștere în primele faze de vegetație

rapid ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐

Nivelul caracterului "staygreen"

mediu-pronunțat ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Talia plantei

foarte mare ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Pretabilitatea pentru siloz


foarte bună ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐

Densitate în condiții de irigat

70.000 - 80.000 boabe germinabile / ha

Densitate în condiții de neirigat

60.000 - 70.000 boabe germinabile / ha



Legendă

- Rețeaua de testare proprie a Donau Saat și centre de testare a solurilor și hibrizilor
- Câmpuri demonstrative sau testare ale partenerilor



Artenyo

FAO 360

DENTAT

- ✓ Constant în rezultate chiar și în condiții dificile de cultură
- ✓ Toleranța bună la caderea plantelor
- ✓ Hibrid pretabil tehnologiei intensive de cultură



FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ


Toleranță față de sfâșierea frunzelor (*Helminthosporium turcicum*)

Toleranță față de putregaiul tulpinilor (*Erwinia sp.*)

Vigurozitate

Rezistența față de cădere

Rezistența față de frângerea tulpinilor



CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Textura bobului

Dentiformis

Utilizare

Recoltare boabe sau siloz plantă întreagă, furajare boabe sau siloz

Ritmul de creștere în primele faze de vegetație

Nivelul caracterului "staygreen"

Talia plantei

Nr de boabe pe rând

36-40

Nr. de rânduri de boabe

16-20



CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Pretabilitatea pentru siloz




Densitate în condiții de irigat

70.000 - 80.000 boabe germinabile / ha

Densitate în condiții de neirigat

60.000 - 70.000 boabe germinabile / ha



Legendă

- Rețeaua de testare proprie a Donau Saat și centre de testare a solurilor și hibrizilor
- Câmpuri demonstrative sau testare ale partenerilor

PORUMB



DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO

Arcadio



FAO 380



DENTAT

- ✓ Hibrid de ultimă generație înregistrat inclusiv în catalogul Românesc în 2022.
- ✓ Hibrid recomandat tehnologiilor intensive de cultură
- ✓ Hibrid cu bobul dentat destinat exclusiv producției de boabe ce pierde foarte rapid umiditatea la maturitate.



FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Toleranță față de sfâșierea frunzelor (*Helminthosporium turcicum*)

mediu-bună

Toleranță față de putregaiul tulpinilor (*Erwinia sp.*)

mediu-slabă

Toleranță față de taciunile comune (*Ustilago maydis*)

mediu-slabă

Rezistența la temperaturile scăzute din primăvară

bună

Vigurozitate

foarte bună

Rezistența față de cădere

bună

Rezistența față de frângerea tulpinilor

mediu-bună

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Textura bobului

Dentiformis

Nr de boabe pe rând

35-38

Utilizare

Recoltare boabe, furajare boabe

Nr. de rânduri de boabe

18-20

Masa a o mie de boabe (la recoltare)

300-340 g

Ritmul de creștere în primele faze de vegetație

foarte rapid

Nivelul caracterului "staygreen"

scăzut

Talia plantei

medie-joasă

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Pretabilitatea pentru siloz


scăzută

Densitate în condiții de irigat

70.000 - 80.000 boabe germinabile / ha

Densitate în condiții de neirigat

60.000 - 70.000 boabe germinabile / ha



Legendă

- Rețeaua de testare proprie a Donau Saat și centre de testare a solurilor și hibrizilor
- Câmpuri demonstrative sau testare ale partenerilor

Solitario

● **FAO 380** ● **DENTAT**

- ✓ Hibrid de ultimă generație înregistrat în catalogul Românesc în 2022.
- ✓ Hibrid rustic cu o bună adaptare într-un areal vast de cultură al porumbului.
- ✓ Dezvoltare foarte rapidă în primele faze de vegetație; producții sigure.



FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Toleranță față de sfâșierea frunzelor (*Helminthosporium turcicum*)

mediu-bună ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

Toleranță față de fuzarioza stiuletilor (*Fusarium sp.*)

medie ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Rezistența la temperaturile scăzute din primăvară

foarte bună ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐

Vigurozitate

foarte bună ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐

Rezistența față de cădere

bună ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐

Rezistența față de frângerea tulpinilor

bună ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Textura bobului

Dentiformis

Utilizare

Recoltare boabe, furajare boabe

Masa a o mie de boabe (la recoltare)

Ritmul de creștere în primele faze de vegetație

Nivelul caracterului "staygreen"

Talia plantei

Nr de boabe pe rând

35-38

Nr. de rânduri de boabe

16-18

300-340 g ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐

foarte rapid ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐

scăzut ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

medie ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Pretabilitatea pentru siloz


medie ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

Densitate în condiții de irigat

70.000 - 80.000 boabe germinabile / ha

Densitate în condiții de neirigat

60.000 - 70.000 boabe germinabile / ha



Legendă

- Rețeaua de testare proprie a Donau Saat și centre de testare a solurilor și hibrizilor
- Câmpuri demonstrative sau testare ale partenerilor

PORUMB



DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO

Multipel

FAO 400

DENTAT

- ✓ Potențial de producție excelent;
- ✓ Dezvoltare foarte buna în primele faze de vegetație;
- ✓ Toleranța crescută la *Fusarium*.



FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Toleranță față de sfâșierea frunzelor (*Helminthosporium turcicum*)

bună

Toleranță față de putregaiul tulpinilor (*Erwinia sp.*)

mediu-bună

Toleranță față de taciunile comune (*Ustilago maydis*)

bună

Toleranță față de fuzarioza stiuletilor (*Fusarium sp.*)

bună

Rezistența la temperaturile scăzute din primăvară

bună

Vigurozitate

bună

Rezistența față de cădere

foarte bună

Rezistența față de frângerea tulpinilor

mediu-bună

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Textura bobului

Dentiformis

Utilizare

Morarit, furajare

Ritmul de creștere în primele faze de vegetație

Nivelul caracterului "staygreen"

Talia plantei

Nr de boabe pe rând

34-38

Nr. de rînduri de boabe

18-22

rapid

slab pronunțat

înaltă


CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Densitate în condiții de irigat

70.000 - 80.000 boabe germinabile / ha

Densitate în condiții de neirigat

60.000 - 70.000 boabe germinabile / ha



Legendă

- Rețeaua de testare proprie a Donau Saat și centre de testare a solurilor și hibrizilor
- Câmpuri demonstrative sau testare ale partenerilor

Arsantto

● **FAO 410** ● **DENTAT**

- ✓ Hibrid nou, înregistrat în 2020, cu randamente unirome în principalele zone de cultură a porumbului din România.
- ✓ Hibrid pretabil pentru utilizare dublă pentru recoltare boabe sau siloz.
- ✓ Foarte bună toleranță față de tăciunele comun și fuzarioză.



FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Toleranță față de sfâșierea frunzelor (*Helminthosporium turcicum*)

foarte bună 

Toleranță față de putregaiul tulpinilor (*Erwinia sp.*)

foarte bună 

Toleranță față de tăciunele comun (*Ustilago maydis*)

bună 

Toleranță față de fuzarioza stiuletilor (*Fusarium sp.*)

foarte bună 

Vigurozitate

bună 

Rezistență față de cădere

foarte bună 

Rezistență față de frângerea tulpinilor

foarte bună 

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Textura bobului

Dentiformis

Utilizare

Recoltare boabe, furajare boabe

Masa a o mie de boabe (la recoltare)

Ritmul de creștere în primele faze de vegetație

Nivelul caracterului "staygreen"

Talia plantei

Înălțimea de inserție

Nr de boabe pe rând

32-38

Nr. de rînduri de boabe

16-20

320-360 g 

mediu-rapid 

pronunțat 

foarte mare 

medie-înaltă 


CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Densitate în condiții de irigat

70.000 - 80.000 boabe germinabile / ha

Densitate în condiții de neirigat

60.000 - 70.000 boabe germinabile / ha



Legendă

-  Rețeaua de testare proprie a Donau Saat și centre de testare a solurilor și hibrizilor
-  Câmpuri demonstrative sau testare ale partenerilor

PORUMB



Katedrall

FAO 440

DENTAT



DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO



- ✓ Producție excelentă de boabe.
- ✓ Caracterul pronunțat staygreen împreună cu foliajul abundent îl recomandă și pentru utilizarea ca siloz.
- ✓ Rezistența la rupere și frângere.



FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Toleranță față de sfâșierea frunzelor (*Helminthosporium turcicum*)

bună



Toleranță față de putregaiul tulpinilor (*Erwinia sp.*)

foarte bună



Toleranță față de taciunile comune (*Ustilago maydis*)

bună



Toleranță față de fuzarioza stiuiletilor (*Fusarium sp.*)

mediu-bună



Rezistența la temperaturile scăzute din primăvară

bună



Vigurozitate

medie-bună



Rezistența față de cădere

bună



Rezistența față de frângerea tulpinilor

foarte bună



CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Textura bobului

Dentiformis

Nr. de boabe pe rând

40-42

Utilizare

Recoltare boabe sau siloz planta întreagă; furajare boabe și siloz, producție biogaz

Nr. de rânduri de boabe

18-20

Masa a o mie de boabe (la recoltare)

340-380 g



Ritmul de creștere în primele faze de vegetație

mediu-rapid



Nivelul caracterului "staygreen"

foarte pronunțat



Talia plantei

foarte mare



CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Pretabilitatea pentru siloz

foarte mare




Densitate în condiții de irigat

70.000 - 80.000 boabe germinabile / ha

Densitate în condiții de neirigat

60.000 - 70.000 boabe germinabile / ha



Legendă

- Rețeaua de testare proprie a Donau Saat și centre de testare a solurilor și hibrizilor
- Câmpuri demonstrative sau testare ale partenerilor



- ✓ Agroking este un hibrid luxuriant, perfect pentru siloz și biogaz;
- ✓ Agroking are un stay green accentuat ;
- ✓ Producții excelente de masa verde și uscată (pentru siloz)



FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Toleranță față de sfâșierea frunzelor (*Helminthosporium turcicum*)

bună ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Toleranță față de putregaiul tulpinilor (*Erwinia sp.*)

foarte bună ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐

Toleranță față de fuzarioza stiuletilor (*Fusarium sp.*)

mediu-bună ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

Vigurozitate

medie-bună ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

Rezistența față de cădere

bună ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐

Rezistența față de frângerea tulpinilor

foarte bună ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Textura bobului

Dentiformis

Utilizare

Recoltare boabe sau siloz planta întreagă; furajare boabe și siloz, producție biogaz

Nr de boabe pe rând

40-42

Nr. de rînduri de boabe

18-20

Masa a o mie de boabe (la recoltare)

340-380 g ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐

Ritmul de creștere în primele faze de vegetație

mediu-rapid ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

Nivelul caracterului "staygreen"

foarte pronunțat ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐

Talia plantei

foarte mare ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Pretabilitatea pentru siloz


foarte mare ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐

Densitate în condiții de irigat

70.000 - 80.00 boabe germinabile / ha

Densitate în condiții de neirigat

60.000 - 70.000 boabe germinabile / ha



Legendă

- Rețeaua de testare proprie a Donau Saat și centre de testare a solurilor și hibrizilor
- Câmpuri demonstrative sau testare ale partenerilor



DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO

SOIA





DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO

Gama vastă de soiuri de soia de mare productivitate și precocități variate

SOIA

SYLVIVUS



AMIATA



ADELFA



ABACA



ANGELICA

ATANGA



APOLLINA



Pentru a susține producătorii agricoli ce aleg soiurile din oferta Donau Saat să valorifice toate beneficiile unei culturi de soia este oferit cu **titlu gratuit** bacterizantul pentru asimilarea azotului atmosferic în sol.

PROMOȚIE

Toate soiurile noi sunt puse la dispoziție cu tratamente premium ale semințelor (Optifit sau FixFertig) exclusiv preinoculate.



SOIA

DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO

SY Livius



GRUPA 000

- ✓ Soi de maturitate timpurie - extratimpurie.
- ✓ Foarte bună stabilitate a produțiilor.
- ✓ Capacitate ridicată de ramificare și dezvoltare superioară a taliei.
- ✓ Soi cu calitate excelentă pentru industria alimentară (conținut ridicat de zahăr).



FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Vigoare după răsărire

Toleranța față de scuturare

Rezistența la cădere

Potențial de producție

Toleranța față de *Peronospora*Toleranța față de *Sclerotinia*

Toleranța față de bacterioze

Toleranța față de viroze

foarte bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐
foarte bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐
foarte bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐
ridicat, stabil	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐
bună	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
bună	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
bună	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
bună	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Tip de creștere

Nedeterminată

Precocitatea recoltării

Timpurie

Înălțime inserție păstăi

Mijlociu - înaltă

Culoarea hilului

Deschisă

Conținut de grăsimi (%)

Peste 20%

Precocitatea înfloririi

Timpurie

Înălțimea plantei

Mijlociu - înaltă

Culoare inflorescență

Violet

Masa a o mie de boabe (grame)

180 - 220

Conținut de proteină (%)

Peste 40%

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări

Recomandat în toate zonele de cultură ale soiei, cu precădere în Podisul Transilvaniei, nord-estul și vestul țării inclusiv în afara arcului Carpat

Norma de semănare (se calculează în funcție de germinativitate și MMB)


60 boabe/mp, la o adâncime de 3-4 cm

Perioada recomandată de semănat

A doua decadă a lunii aprilie, chiar până la mijlocul lunii mai (în funcție de condițiile climatice și de istoricul zonei de cultură)

Distanța optimă între rânduri (cm)

15-24



Legendă

- Rețeaua de testare proprie a Donau Saat și centre de testare a solurilor și hibrizilor
- Câmpuri demonstrative sau testare ale partenerilor

Amiata

GRUPA 00-000

- ✓ Soi timpuriu cu adaptabilitate excelentă pentru condițiile de cultură pentru Europa Centrală și de Est
- ✓ Înregistrat în catalogul European în 2019 și testat în România începând cu anul 2020
- ✓ Rezultate foarte bune și constante în condițiile de cultură din țara noastră



FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Vigoare după răsărire
Toleranța față de scuturare
Rezistența la cădere
Potențial de producție
Toleranța față de *Peronospora*
Toleranța față de *Sclerotinia*
Toleranța față de bacterioze
Toleranța față de viroze

foarte bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐
foarte bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐
foarte bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐
ridicat, stabil	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐
bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
bună	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
bună	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
bună	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Tip de creștere

Nedeterminată

Precocitatea recoltării

Timpurie

Înălțimea inserției păstăi

Mijlociu - înaltă

Culoare hil

Deschisă

Conținut de grăsimi (%)

Peste 20%

Precocitatea înfloririi

Timpurie

Înălțimea plantei

Mijlociu - înaltă

Culoare inflorescență

Violet

Masa a o mie de boabe (grame)

180 - 220

Conținut de proteină (%)

Peste 40%

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări

Recomandat în toate zonele de cultură ale soiei, cu precădere în Podisul Transilvaniei, nord-estul și vestul țării inclusiv în cele din afara arcului Carpatic

Norma de semănare (se calculează în funcție de germinatie și MMB)


60 boabe/mp, la o adâncime de 3-4 cm

Perioada recomandată de semănat

A doua decadă a lunii aprilie, chiar până la mijlocul lunii mai (în funcție de condițiile climatice și de istoricul zonei de cultură)

Distanța optimă între rânduri (cm)

15-24



Legendă

- Rețeaua de testare proprie a Donau Saat și centre de testare a solurilor și hibrizilor
- Câmpuri demonstrative sau testare ale partenerilor

SOIA



Adelfia

GRUPA -000

DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO

- ✓ Potențial de producție foarte ridicat.
- ✓ Conținut ridicat de proteină.
- ✓ Toleranță ridicată la boli și dăunători.



FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Vigoare după răsărire

Toleranța față de scuturare


Rezistența la cădere

Potențial de producție

Toleranța față de *Peronospora*Toleranța față de *Sclerotinia*

Toleranța față de bacterioze

Toleranța față de viroze



CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Tip de creștere

Nedeterminată

Precocitatea recoltării

Timpurie

Înălțime inserție păstăi

Mijlociu - înaltă

Culoare hil

Deschisă

Conținut de grăsimi (%)

Mediu-ridicat

Precocitatea înfloririi

Timpurie

Înălțimea plantei

Mijlociu - înaltă

Culoare inflorescență

Violet

Masa a o mie de boabe (grame)

180 - 220

Conținut de proteină (%)

Peste 40%

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări

Recomandat în toate zonele de cultură ale soiei, în special în sudul țării, sud-est și sud-vest

Perioada recomandată de semănat

A doua decadă a lunii aprilie, chiar până la început de mai (în funcție de condițiile climatice și de istoricul zonei de cultură)

Norma de semănat (se calculează în funcție de germinatie și MMB)

50-55 boabe/mp, la o adâncime de 3-4 cm

Distanța optimă între rânduri (cm)

15-24



Legendă

- Rețeaua de testare proprie a Donau Saat și centre de testare a solurilor și hibrizilor
- Câmpuri demonstrative sau testare ale partenerilor

Abaca



GRUPA-000+

- ✓ Datorită toleranței la *Sclerotinia*, este recomandată pentru rotații de culturi intensive de soia.
- ✓ Potențial de producție foarte ridicat
- ✓ Abaca este unul dintre cele mai reprezentative soiuri extra-timpurii ale Saatzucht Donau



FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Vigoare după răsărire

foarte bună

Toleranța față de scuturare

bună

Rezistența la cădere

bună

Potențial de producție

foarte ridicat

Toleranța față de *Peronospora*

medie

Toleranța față de *Sclerotinia*

medie

Toleranța față de bacterioze

medie-bună

Toleranța față de viroze

bună

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Tip de creștere

Nedeterminată

Precocitatea recoltării

Timpurie

Înălțime inserție păstăi

Mijlociu - înaltă

Culoare hil

Deschisă

Conținut de grăsimi (%)

Mediu-ridicat

Precocitatea înfloririi

Timpurie

Înălțimea plantei

Mijlociu - înaltă

Culoare inflorescență

Violet

Masa a o mie de boabe (grame)

180 - 220

Conținut de proteină (%)

Peste 40%

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări

Recomandat în toate zonele de cultură ale soiei, în special în sudul țării, sud-est și sud-vest

Norma de semănare (se calculează în funcție de germinatie și MMB)

50-55 boabe/mp, la o adâncime de 3-4 cm

Perioada recomandată de semănat

A doua decadă a lunii aprilie, chiar până la început de mai (în funcție de condițiile climatice și de istoricul zonei de cultură)

Distanța optimă între rânduri (cm)

15-24



Legendă

- Rețeaua de testare proprie a Donau Saat și centre de testare a solurilor și hibrizilor
- Câmpuri demonstrative sau testare ale partenerilor

SOIA



Angelica

GRUPA 00



DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO

- ✓ Soi cu plasticitate foarte bună cu rezultate foarte bune în diferite condiții de sol și climă
- ✓ Tolerant la cădere și scuturare
- ✓ Soi cu potențial excelent de producție, recomandat și pentru industria alimentară (la obținerea de ulei)



FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Vigoare după răsărire
Toleranța față de scuturare
Rezistența la cădere
Potențial de producție
Toleranța față de *Peronospora*
Toleranța față de *Sclerotinia*
Toleranța față de bacterioze
Toleranța față de viroze



CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Tip de creștere

Nedeterminată

Precocitatea recoltării

Mijlociu

Înălțime inserție păstăi

Mijlocie - înaltă

Culoare hil

Deschisă

Conținut de grăsimi (%)

Peste 20%

Precocitatea înfloririi

Mijlociu - timpurie

Înălțimea plantei

Înaltă

Culoare inflorescență

Violacee

Masa a o mie de boabe (grame)

180 - 240

Conținut de proteină (%)

40 - 42% (în medie)

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări

Recomandat în toate zonele de cultură ale soiei

Perioada recomandată de semănat

A doua decadă a lunii aprilie, chiar până la mijlocul lunii mai (în funcție de condițiile climatice și de istoricul zonei de cultură)

Norma de semănare (se calculează în funcție de germinativitate și MMB)

50-55 boabe/mp. la o adâncime de 3-4 cm

Distanța optimă între rânduri (cm)

15-24



Legendă

- Rețeaua de testare proprie a Donau Saat și centre de testare a solurilor și hibrizilor
- Câmpuri demonstrative sau testare ale partenerilor

Atanga


GRUPA 0

- ✓ Potețial ridicat de producție.
- ✓ Talie medie spre înaltă cu rezistență foarte bună la fângere și rezistență față de nematozi
- ✓ Culoarea hilului galbenă.
- ✓ Creștere nedeterminată.



FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Vigoare după răsărire
 Toleranța față de scuturare
 Rezistența la cădere
 Potențial de producție
 Toleranța față de *Peronospora*
 Toleranța față de *Sclerotinia*
 Toleranța față de bacterioze
 Toleranța față de viroze



CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Tip de creștere

Nedeterminată

Precocitatea recoltării

Tardivă

Înălțime inserție păstăi

Mijlociu - înaltă

Culoare hil

Deschisă

Conținut de grăsimi (%)

Mediu-ridicat

Precocitatea înfloririi

Tardivă

Înălțimea plantei

Mijlociu-înaltă

Culoare inflorescență

Violet

Masa a o mie de boabe (grame)

190 - 250

Conținut de proteină (%)

40 - 42% (în medie)

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări

Recomandat în toate zonele de cultură ale soiei, cu precădere în Podisul Transilvaniei, nord-estul și vestul țării

Norma de semănare (se calculează în funcție de germinatie și MMB)

50-55 boabe/mp, la o adâncime de 3-4 cm

Perioada recomandată de semănat

A doua decadă a lunii aprilie, chiar până la început de mai (în funcție de condițiile climatice și de istoricul zonei de cultură)

Distanța optimă între rânduri (cm)

15-24



Legendă

- Rețeaua de testare proprie a Donau Saat și centre de testare a solurilor și hibridurilor
- Câmpuri demonstrative sau testare ale partenerilor

SOIA



Apollina

GRUPA 000

DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO

- ✓ Creștere nedeterminată.
- ✓ Potențial ridicat de producție.
- ✓ Conținut foarte ridicat de proteină.
- ✓ Rezistență ridicată la spargerea bobului



FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Vigoare după răsărire

Toleranța față de scuturare

Rezistența la cădere

Potențial de producție

Toleranța față de *Peronospora*Toleranța față de *Sclerotinia*

Toleranța față de bacterioze

Toleranța față de viroze

medie									
foarte bună									
bună									
foarte ridicat									
bună									
bună									
bună									
bună									

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Tip de creștere

Nedeterminată

Precocitatea recoltării

Timpurie

Înălțime inserție păstăi

Mijlociu - înaltă

Culoare hil

Deschisă

Conținut de grăsimi (%)

Mediu-ridicat

Precocitatea înfloririi

Timpurie

Înălțimea plantei

Mijlociu - înaltă

Culoare inflorescență

Violet

Masa a o mie de boabe (grame)

180 - 220

Conținut de proteină (%)

Peste 40%

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări

Recomandat în toate zonele de cultură ale soiei, în special în sudul țării, sud-est și sud-vest

Norma de semănare (se calculează în funcție de germinatie și MMB)

50-55 boabe/mp, la o adâncime de 3-4 cm

Perioada recomandată de semănat


A doua decadă a lunii aprilie, chiar până la mijlocul lunii mai (în funcție de condițiile climatice și de istoricul zonei de cultură)

Distanța optimă între rânduri (cm)

15-24

EVOLUȚIA DOBÂNDIRII MATURITĂȚII FIZIOLOGICE A SOIURILOR DE SOIA

Grupa de maturitate



Numar de zile distanță în atingerea maturității fiziologice a soiurilor de soia

SOIURI NOI



DONAU SAAT



Binealegibineculegi.ro

SY Livius | Amiata | Abaca | Apollina | Adelfia

Donau Saat oferă soluții pentru susținerea producătorilor agricoli să acceseze programele din PNS 2023-2027 pachetele PD-04, PD-5 și PD-09 pentru venituri suplimentare de până la 150 euro/ha:

- soiuri valoroase de soia
- genetica de ultimă generație
- maturități extratimpurii adaptate condițiilor locale de cultură



DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO

CEREALE PRIMĂVARĂ, CULTURI SPECIALE





DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO

**Alegeți dintr-un portofoliu
dinamic și diversificat pus în
slujba dumneavoastră**

CEREALE DE PRIMĂVARĂ CULTURI SPECIALE

GRANNY
GRÂU PRIMĂVARĂ

WILMA
ORZOAICĂ

PROKOP
OVĂZ

OMEGALIN
IN PENTRU ULEI

CLEOPATRA
RAPIȚĂ DE PRIMĂVARĂ

CARNELA
MUȘTAR

BIORRO
BOB



CEREALE PRIMĂVARĂ

Granny



GRÂU PRIMĂVARĂ

SEMI-TIMPURIU

ARISTAT

DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO

- ✓ GRANNY este un soi de grâu de primăvară ce se poate semăna și toamna târziu, în afara epocii de semănat grâu de toamnă
- ✓ Este o alternativă viabilă a grâului de toamnă atunci când condițiile din timpul însămânțărilor de toamnă nu au fost prielnice
- ✓ Este caracterizat de o bună calitate (panificație) a producției și un nivel peste medie al toleranței față de principalele boli

FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Toleranța față de ger	foarte bună	
Rezistența la înclinare și cădere	medie	
Rezistența la încolțirea în spic	foarte bună	
Toleranța față de Blumeria (fâinare)	bună	
Toleranța față de P. rec. (rugina brună)	bună	
Toleranța față de Septoria n.	medie	
Toleranța față de Fusarium	bună	

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Potențial de producție	ridicat	
Calitatea producției	B	
Înspicare	bună	
Maturitate	semi-tardivă	
Capacitate de înfrățire	medie	
Număr de boabe în spic	mare	
Masa a o mie de boabe (grame)	medie	
Masa hectolitică (kg/hl)	medie	

Tipul spicului

Nearistat, semi-compact

Înălțimea plantei

Medie-mare / 80 - 95 cm

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări

Recomandat în toate zonele de cultură a grâului.

Potențial productiv în zone aride

Potențial productiv în zone umede

Norma de semănat

320 - 450 b.g./mp

ridicat	
ridicat	

Wilma



ORZ 2 R PRIMĂVARĂ

SEMI-TIMPURIU



- ✓ WILMA este un soi de orz de primăvară pe 2 rânduri cu grad foarte ridicat al plasticității ecologice
- ✓ Prezintă o tulpină ameliorată pentru buna rezistență la cădere precum și un bun pachet de toleranță față de principalele boli criptogame

FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Toleranța față de ger	foarte bună	
Rezistența la înclinare și cădere	medie-bună	
Toleranța față de Blumeria (fâinare)	scăzută	
Toleranța față de P. rec. (rugina brună)	medie-joasă	

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNIKE

Potențial de producție	ridicat	
Calitatea producției	B	
Înspicare	semi-timpurie	
Maturitate	semi-timpurie	
Capacitate de înfrățire	medie	
Număr de boabe în spic	mare	
Masa a o mie de boabe (grame)	mare	
Masa hectolitică (kg/hl)	medie	
Conținut de proteină	mediu-scăzut	
Indice de cadere	mediu	

Tipul spicului

Aristat, compact

Înălțimea plantei

Medie 70-85 cm

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări

Recomandat în toate zonele de cultură a orzului. Însămânțarea se poate declanșa primăvara, devreme, la începutul primei epoci.

Norma de semănat

340 - 390 b.g./mp



FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Rezistența la înclinare și cădere

medie



Toleranța față de Blumeria (făinare)

medie-joasă



CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Tipul spicului

Nearistat, semi-compact

Potențial de producție

Calitatea producției

Înspicare

Maturitate

Capacitate de înfrățire

Număr de boabe în spic

Masa a o mie de boabe (grame)

Masa hectolitrică (kg/hl)

-

Conținut de proteină

-

Înălțimea plantei

Medie / 75 - 95 cm

ridicat



bună



semi-timpurie



semi-timpurie



medie



mare



medie



medie



-



mediu-scăzut



-



CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări

Recomandat în toate zonele de cultură a grâului.

Potențial productiv în zone aride

Potențial productiv în zone umede

Norma de semănat

320 - 400 b.g./mp

mediu



mediu



Omegalin



IN PENTRU ULEI



OMEGALIN este un soi timpuriu de in, cu un continut foarte ridicat de ulei

FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Potențial de producție

ridicat și stabil



MMB

mijlocie



Conținut de ulei

foarte bun (40-44%)



Culoare bob la maturitate

Maronie

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Toleranța la cadere

foarte bună



Toleranța față de fainare

foarte bună



Toleranța față de fuzarioza

foarte bună



CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări

Toate zonele de cultură

Perioada recomandată de semănat

Începând cu a două decadă a lunii martie și pe parcursul lunii aprilie

Norma de semănat

700 semințe/mp; 40-70kg/ha



Cleopatra



RAPIȚĂ PRIMĂVARĂ

● TIMPURIU

- ✓ Soiul Cleopatra este deja cunoscut și apreciat de cultivatorii din țară, fiind un soi cu potențial foarte bun de producție și conținut ridicat de ulei
- ✓ Cleopatra se caracterizează printr-o plantă sănătoasă pe toată perioada vegetației

FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Rezistența la înclinare și frângere

foarte bună



Rezistența la scuturare

bună



Toleranța față de Sclerotinia

foarte bună



Toleranța față de Phoma

foarte bună



CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Precocitatea înfloririi

Timpurie

Potențial de producție

ridicat și constant



Maturitate

Timpurie

Înălțimea plantei

Medie/ 100 - 140 cm

Conținut de ulei (%)

ridicat 40-44

Masa a o mie de boabe (grame)

Mediu-mic 3,5-4,4 g

Conținut de glucozinolați

Foarte scăzut

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Potențial productiv (boabe) în zone aride

ridicat



Potențial productiv (boabe) în zone umede

ridicat



Zonare și recomandări

Recomandat a se însămânța la desprimăvărare, în prima epocă (cât mai repede se poate intra la lucru). Recomandat pentru toate zonele de cultură din România.

Tehnologia de cultură

Clasică

Norma de semănare

80-110 b.g./mp

Carnela



MUȘTAR

- ✓ CARNELLA este un soi de muștar bine adaptat condițiilor de cultură din țara noastră, cu sistem radicular bine dezvoltat, ajutând împotriva eroziunii solului
- ✓ CARNELLA este adaptat și pentru semănat tardiv, având toleranță bună la nematozi.
- ✓ Recomandare: aport suplimentar de azot, medie 40-60 kg (s. a.), este binevenit, iar plantă profită maximizând producția

FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Înălțimea plantei

medie-înaltă



MMB

mijlocie



Precocitatea înfloririi

Semi-timpurie

Precocitatea recoltării

Mijlocie

Culoarea bobului la maturitate

Galben deschis

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Toleranță la îngheț

medie-bună



Vigoare după răsărire

foarte bună



Rezistență la frângere

bună



Toleranță față de nematozi

foarte bună



Potențial de producție

ridicat, constant



CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări

Toate zonele de cultura ale muștarului

Perioada recomandată de semănat

Primăvara - începând cu luna martie. Toamna - începând cu luna august

Norma de semănat

20kg/ha

Biorro



BOB



MIJLOCIU-SEMITARDIV

- ✓ BIORO este un soi de bob cu maturitate semitardivă, cu dezvoltare foarte bună în primele faze de vegetație, acoperind bine teernuk, ajutând implicit la controlul buruienilor, sufocând dezvoltarea lor.

FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

MMB

Conținut în proteină brută

Precocitatea înfloririi

Semi-timpurie

Înălțimea plantei

Înaltă

mijlocie-mare

foarte bun

Precocitatea recoltării

Mijlociu-semitardiv

Culoarea bobului la maturitate

Galben cafeniu, cu hil închis

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Toleranță la îngheț

Vigoare după răsărire

Rezistență la cădere

Toleranță față de scuturare

Potențial de producție

foarte bună

foarte bună

bună

bună

ridicat, stabil

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări


Toate zonele de cultură favorabile culturii de mazere cu rezultate bune și constante

Norma de semanat

30-35 b.g/mp, la adâncimea de 8-10cm

Perioada recomandată de semanat


Începând cu luna februarie, cât de timpuriu se poate, pe măsură ce condițiile climatice permit intrarea în câmp





DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO

SPECII ȘI AMESTECURI FURAJERE





DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO

**Gama performanta de amestecuri
profesionale ale semințelor destinate
furajării prin pășunat sau însilozare**

SEMINȚE ȘI AMESTECURI FURAJERE

- GRUNLANDPROFI KB
- GRUNLANDPROFI EB
- GRUNLANDPROFI PS
- REICHERSBERGER
- FUTTERPROFI LR
- FUTTERPROFI KM
- FUTTERPROFI EI





MIXURI FURAJERE



DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO



Grunlandprofi KB

AMESTEC PENTRU REÎNSĂMÂNȚARE SAU SUPRAÎNSĂMÂNȚARE

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- ✓ Amestec destinat reînsămânțării sau supraînsămânțării pentru tranziția spre un regim intensiv de exploatare a pășunilor.
- ✓ Sunt obținute 4 până la 6 tăieri pe an.
- ✓ Este recomandat în special pentru zonele aride ori cu favorabilitate scăzută.
- ✓ Acoperire rapidă a golurilor de-o palmă din teren.
- ✓ Grad mare de competitivitate cu o toleranță foarte ridicată față de secetă și foarte bună rezistență față de îngheț.

DESCRIERE GENERALĂ

Amestec furajer pentru condiții aride și favorabilitate scăzută. GRÜNLANDPROFI KB este foarte potrivit pentru îmbunătățirea toleranței față de secetă și a rezistenței față de îngheț a pășunilor existente.

Raigras-ul englezesc și trifoiul roșu asigură o acoperire rapidă a terenului și în special a golurilor. În completarea amestecului se regăsește firuța (Poa pratensis). Aceasta specie graminee de talie joasă se remarcă printr-o bună acoperire a terenului; sistemul radicular bine-dezvoltat în profunzime îi asigură o dezvoltare viguroasă.

Chiar și în condiții aride, GRÜNLANDPROFI KB poate realiza producții prin care să asigure cel puțin aprovizionarea de bază cu furaj. Disponibil și în varianta cu certificare BIO.

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Toleranță față de secetă

foarte ridicată

Rezistență la iernare

foarte ridicată

Adaptabilitate față de condiții aride de cultură

foarte ridicată

Pretabilitate pentru utilizare pentru pășunat

foarte ridicată

Pretabilitate pentru utilizare ca furaj verde

ridică

Pretabilitate pentru însilozare

ridică

Pretabilitate pentru utilizare sub formă de fâneată

foarte ridicată

Zonare

Recomandat în toate arealele de cultură inclusiv pe terenuri dificile.

Durata de utilizare

Destinat reînsămânțării ori supraînsămânțării pentru o perioadă medie de 3 ani în funcție de gradul de favorabilitate pedoclimatică din arealul de cultură

Compoziție

18% raigras englezesc (Lolium perenne), 4% trifoi roșu (Festuca rubra), 30% golomăt (Dactylis glomerata), 7% trifoi alb (Trifolium repens), 8% paius de livadă (Festuca arundinacea), 24% firuța (Poa pratensis), 12% timoftica (Pleum pratense)

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări

Amestec destinat în special zonelor cu aport pluviometric redus ori terenurilor grele. Destinația principală este pentru supraînsămânțarea pajiștilor începând cu 3 ani de la înființare.

Perioada recomandată de semănat

Aprilie - august

Potențial productiv în zone aride

4 până la 5 tăieri

Potențial productiv în zone cu favorabilitate crescută

5 până la 6 tăieri

Norma de semănat - înființare

30 kg/ha

Norma de semănat - supraînsămânțare

20-25kg/ha

Norma de semănat - reînsămânțare periodică

10-15kg/ha

Grunlandprofi EB



● **AMESTEC FURAJER CU RANDAMENT RIDICAT PENTRU CONDIȚII DIFICILE**

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- ✓ GRÜNLANDPROFI EB este un amestec dezvoltat împreună cu specialiști ai camerelor agricole
- ✓ Datorită bunei toleranțe față de secetă și rezistența la îngheț este foarte bine adaptat inclusiv în zone uscate și cu condiții dificile de cultură
- ✓ Amestec furajer de mare productivitate cu foarte bună întrebuințare pentru însilozare
- ✓ Sunt posibile în medie 4 - 6 tăieri pe an
- ✓ Amestecul este disponibil și în regim de certificare ecologică

DESCRIERE GENERALĂ


GRÜNLANDPROFI EB este o soluție optimă pentru reînsămânțarea pășunilor puternic deteriorate (goluri de-o palma) precum și pentru terenurile în curs de conversie pentru pasunat ori atunci când este necesară suprainsămânțarea cu specii valoroase a unor pasuni existente.

Amestecul se bucură de-un amestec unic de specii atent selectate pentru aportul nutritiv ridicat, palatabilitate sporită completată de o foarte bună digestibilitate. Aceste atribute califică mix-ul propus în special pentru utilizarea sub formă de siloz.

Speciile selectate răspund foarte pozitiv aplicării fertilizantilor pe bază de azot obținându-se astfel cu multă ușurință incizi calitativi și cantitativi superiori. Ponderea sporită de golomat (*Dactylis glomerata*) și reluarea rapidă a dezvoltării vegetative asigură producții sigure inclusiv în anii secetoși.

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Toleranță față de secetă
 Rezistență la iernare
 Adaptabilitate față de condiții aride de cultură
 Pretabilitate pentru utilizare pentru pășunat
 Pretabilitate pentru utilizare ca furaj verde
 Pretabilitate pentru însilozare
 Pretabilitate pentru utilizare sub formă de fânăță



Zonare

Recomandat în toate arealele de cultură în special în zonele de luncă, pe terenuri dificile ori în condiții cu aport hidric redus.

Durata de utilizare

În funcție de gradul de favorabilitate climatică de pe parcursul perioadei de vegetație precum și intensitatea pășunatului se recomandă suprainsămânțarea ori reînsămânțarea începând cu finele anului 2 sau 3.

Compoziție

5% trifoi alb (*Trifolium repens*), 5% trifoi roșu (*Trifolium pratense*), 15% timoftică (*Pleum pratense*), 15% firuta (*Poa pratensis*), 30% golomat (*Dactylis glomerata*), 30% raigras englezesc (*Lolium perenne*)

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări

Amestec destinat înființării pășunilor permanente ori reînsămânțărilor/suprainsămânțărilor. Recomandat în special pentru zonele cu aport pluviometric redus ori cu condiții dificile de cultură.

Perioada recomandată de semănat

Aprilie - august

Potențial productiv în zone aride

4 până la 5 tăieri

Potențial productiv în zone cu favorabilitate crescută

5 până la 6 tăieri

Norma de semănat - înființare

30 kg/ha

Norma de semănat - suprainsămânțare

25-30 kg/ha

Norma de semănat - reînsămânțare periodică

10-15 kg/ha



MIXURI FURAJERE



DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO

Grunlandprofi PS



AMESTEC FURAJER PENTRU PĂȘUNATUL CABALINELOR

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- ✓ Specii de cultură selecționate pentru vigurozitate și rezistență în condițiile pășunatului extensiv
- ✓ Amestecul nu conține specii leguminoase; este format exclusiv din gramine valoroase cu grad ridicat de palatabilitate
- ✓ Recomandat pentru pășuni nou înființate precum și pentru reînsămânțări

DESCRIERE GENERALĂ

Amestec pentru pășuni permanente special dezvoltat pentru cabaline.

GRÜNLANDPROFI PS este un amestec realizat exclusiv cu gramine între care amintim golomățul care îl califică inclusiv pentru arealele aride de cultură.

Datorita compoziției atent echilibrată este pretabil pentru fânețe și stabulație.

Foarte bună adaptare pedoclimatică în toate arealele de cultură din țara noastră asigurând o pajiște densă și robustă.

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Toleranță față de secetă	ridică								
Rezistență la iarnă	ridică								
Adaptabilitate față de condiții aride de cultură	foarte ridică								
Pretabilitate pentru utilizare pentru pășunat	foarte ridică								
Pretabilitate pentru utilizare ca furaj verde	foarte scăzută								
Pretabilitate pentru însilozare	ridică								
Pretabilitate pentru utilizare sub formă de fâneță	foarte ridică								

Durata de utilizare

În funcție de arealele de cultură și condițiile climatice este recomandată reînsămânțarea la fiecare 4-5 ani.

Compoziție

25% Raigras englezesc (*Lolium perenne*), 12% păiuș de livadă (*Festuca pratensis*), 12% păiuș roșu (*Trifolium pratense*), 13% golomăț (*Dactylis glomerata*), 18% firuță (*Poa pratensis*), 10% păiuș înalt (*Festuca arundinacea*), 10% timoftică (*Pleum pratense*)

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări

Amestec recomandat tuturor zonelor de cultură inclusiv în condiții aride.

Amestec special creat în scopul pășunatului liber de către cabaline (inclusiv în stabulație)

Perioada recomandată de semănat

Aprilie - august

Potențial productiv în zone aride

2-3 tăieri

Potențial productiv în zone cu favorabilitate crescută

3 tăieri

Norma de semănat - înființare

30- 35 kg/ha

Norma de semănat - supraînsămânțare

Destinat exclusiv pasunilor înființate cu GRUNLAND PS

Norma de semănat - reînsămânțare periodică

15kg/ha

Reichersberger

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- ✓ REICHERSBERGER este un soi de trifoi rosu ideal pentru furaj, cu productii foarte bune atât ca masa verde cât si masa uscat Prezint toleranță foarte buna la iernare, putând fi cultivat si in zone cu conditii climatice nefavorabile;
- ✓ Trifoiul este o cultura perenă, iar soiul Reichersberger se preteaza la 3-5 coase pe an, putând fi păstrat in cultura până la 4 ani.

FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Toleranță față de cancerul trifoiului

medie ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

Toleranță la îngheț

bună ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Capacitate de producție

4 coase/an ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐

Potențial de producție

Ridicat și stabil, atât pentru masa verde cât și pentru masa uscată

Culoare inflorescență

Roșu-moaliu

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări

Toate zonele de cultură

Perioada recomandată de semanat

Toata luna august

Norma de semănat

20-25kg/ha





MIXURI FURAJERE

Futterprofi LR

● AMESTEC FURAJER DE LUCERNĂ CU TRIFOI ROȘU



DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO



CARACTERISTICI PRINCIPALE

- ✓ 4 până la 5 tăieri dacă sunt efectuate timpuriu (atenție la lignificarea lucernei).
- ✓ Speciile din amestec îl califică drept opțiune foarte bună în arealele cu pluviometrie ridicată fiind în același timp foarte bine adaptat condițiilor secetoase.
- ✓ Ameliorează calitatea terenurilor slab roditoare.
- ✓ Nutrețul realizat este bogat în vitamine și minerale asigurându-i un grad ridicat de digestibilitate.

DESCRIERE GENERALĂ

Amestec furajer compus din lucerna, trifoi și graminee

FUTTERPROFI LR își demonstrează beneficiile în special pe terenurile ușoare, nisipoase, cu piatră prezentă în orizontul A și care sunt calcaroase (începând cu pH 6,5).

Sistemul radicular diferit între speciile din amestec asigură o foarte bună penetrare a solului având în același timp o capacitate superioară pentru fixarea azotului în sol.

Chiar și în zonele cu incidență redusă a precipitațiilor, FUTTERPROFI LR dobândește producții foarte bune raportate la masa uscată cu indici calitativi foarte buni. În anii ploioși producția este sporită datorită trifoiului roșu. Datorită indicelui proteic ridicat este o completare ideală pentru nutrețul din porumb-siloz.

Disponibil și în varianta cu certificare BIO

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Toleranță față de secetă

medie



Rezistență la iernare

ridică



Adaptabilitate față de condiții aride de cultură

foarte ridicată



Pretabilitate pentru utilizare pentru pășunat

foarte scăzută



Pretabilitate pentru utilizare ca furaj verde

foarte ridicată



Pretabilitate pentru însilozare

foarte ridicată



Pretabilitate pentru utilizare sub formă de fână

medie-ridică



Zonare

Recomandat în toate zonele de cultură inclusiv în zone cu regim pluviometric moderat.

Durata de utilizare

În funcție de condițiile climatice exploatarea în optim se poate realiza de la 2 până la 3 ani.

Compoziție

10% trifoi roșu (Trifolium pratense), 5% trifoi alb (Trifolium repens), 35% lucerna (Medicago sativa), 14% raigras englezesc (Lolium perenne), 10% firuta (Poa Pratensis), 10% iarba de ovaz (Arrhenatherum), 11% timoftica (Pleum pratense)

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări

Lucerna impune condiții specifice privind aciditatea solului. Astfel se recomandă înființarea pe terenuri începând cu pH de 6,5. Considerând dezvoltarea armonioasă între speciile amestecului se recomandă tăierea la aproximativ 10 cm. Pentru rezultate superioare se recomandă întreținerea astfel încât la intrarea în iarnă să nu fie depășită înălțimea de 15 cm. Pentru îmbunătățirea capacității regenerative este recomandată efectuarea celei de-a treia coase când apar primele flori.

Perioada recomandată de semănat

Aprilie - august

Potențial productiv în zone aride

3-4 tăieri

Potențial productiv în zone cu favorabilitate crescută

4 tăieri

Norma de semănat - înființare

30 kg/ha

Futterprofi KM



● **AMESTEC FURAJER INTENSIV PENTRU AREALE DIFICILE**

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- ✓ Speciile cu creștere rapidă susțin 5 tăieri
- ✓ Ideal pentru condiții de cultură în areale cu pluviometrie medie ori ridicată
- ✓ Trifoiul roșu și hibridul festuca x lolium asigură proctii însemnate chiar și în anii secetoși
- ✓ Ritm foarte rapid de creștere vegetativă după taiere datorat mix-ului optimizat între soiuri respectiv specii

DESCRIERE GENERALĂ

Amestec de semințe destinate furajării cu conținut sporit de trifoi roșu.

Cu mix-ul FUTTERPROFI KM se obțin producții însemnate de siloz s.u. (materie uscată) cu unul din cei mai ridicați indicatori calitativi. Aceste caracteristici se datorează proporțiilor optimizate între trifoiul roșu și soiul de raigras-ul cu creștere foarte rapidă. Speciile cu creștere lentă asigură producții chiar și atunci când exploatarea fâneței este extensivă.

FUTTERPROFI KM este ideal pentru furajare în special în amestec cu proporții mari de porumb-siloz atunci când conținutul de amidon este ridicat. Astfel se poate menține în optim raportul între proteina brută și conținutul de amidon.

FUTTERPROFI KM poate asigura fermelor zootehnice intensive un aport nutritiv echilibrat. Compoziția amestecului face posibilă obținerea a 5 tăieri datorită capacității foarte rapide de regenerare. Nivelul productiv este susținut chiar și în anii secetoși datorită conținutului de soiuri din specii tolerante față de condiții uscate de cultură (trifoi roșu, festulolium și golomăț).

Disponibil și în varianta cu certificare BIO

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Toleranță față de secetă	medie								
Rezistență la iernare	ridică								
Adaptabilitate față de condiții aride de cultură	ridică								
Pretabilitate pentru utilizare pentru pășunat	foarte scăzută								
Pretabilitate pentru utilizare ca furaj verde	foarte ridicată								
Pretabilitate pentru însilozare	foarte ridicată								
Pretabilitate pentru utilizare sub formă de fâneță	medie-ridică								

Zonare

Recomandat în zonele de cultură cu regim pluviometric mediu ori ridicat precum și în toate zonele în care se cultivă orzul.

Durata de utilizare

În funcție de arealele de cultură și condițiile climatice fâneța poate asigura producții ridicate vreme de 2 până la 3 ani.

Compoziție

28% trifoi roșu (Trifolium pratens), 7% festulolium (hibrid între festuca și lolium), 10% golomăț (Dactylis glomerata), 15% raigras englezesc (Lolium perenne), 5% trifoi alb (Trifolium repens), 11% timoftica (Pleum pratense), 15% lolium bastard.

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări

Recomandat în zonele de cultură cu regim pluviometric mediu ori ridicat precum și în toate zonele în care se cultivă orzul. Pentru rezultate superioare se recomandă însămânțarea la început de epocă.

Perioada recomandată de semanat

Aprilie - august

Potențial productiv în zone aride

3-4 tăieri

Potențial productiv în zone cu favorabilitate crescută

5 tăieri

Norma de semănat - înființare

25 kg/ha



MIXURI FURAJERE



DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO



Futterprofi EI

DEZVOLTAT SPECIAL PENTRU RECOLTAREA ÎMPREUNĂ CU PORUMBUL
PENTRU SILOZ CA PLANTĂ ÎNTREAGĂ

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- ✓ Dezvoltarea foarte rapidă permite una până la două tăieri imediat după semănatul direct în miriște
- ✓ Adaptat pentru exploatare pe parcursul întregului an în toate arealele de cultură
- ✓ Capacitate productivă semnificativă chiar și în anii secetoși
- ✓ Constituie o soluție foarte potrivită a se semăna după cerealele păioase

DESCRIERE GENERALĂ

Amestec furajer peren adaptat tuturor condițiilor de cultură.

FUTTERPROFI EI are capacitatea de a dobândi producții considerabile într-un ritm rapid cu un nivel de palatabilitate foarte ridicat datorită amestecului în compoziție a trifoiului.

Acest mix este optim echilibrat pentru adaptarea în cazurile în care condițiile climatice ori dăunătorii creează deficiențe de bază ale calității nutritive ale furajelor.

Speciile alese pentru amestec sunt atent selecționate pentru compatibilitatea semănatului direct în miriștea de cereale păioase și posibilitatea înființării unei culturi de porumb-siloz în aceeași parcelă. Potențialul productiv este atins în cadrul primelor tăieri.

În zonele de favorabilitate scăzută ale culturii porumbului pentru siloz, FUTTERPROFI EI se poate utiliza ca înlocuitor și astfel sporește cantitatea și calitatea furajului de bază.

Disponibil și în varianta cu certificare BIO

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Toleranță față de secetă	medie	
Rezistență la iernare	ridică	
Adaptabilitate față de condiții aride de cultură	medie	
Pretabilitate pentru utilizare pentru pășunat	foarte scăzută	
Pretabilitate pentru utilizare ca furaj verde	foarte ridicată	
Pretabilitate pentru însilozare	foarte ridicată	
Pretabilitate pentru utilizare sub formă de fână	medie	

Zonare

Recomandat în zonele de cultură cu favorabilitate ridicată pentru porumbul de siloz respectiv în interiorul arcului Carpatic, Crișana, Maramureș, Bucovina și anumite zone din Banat.

Durata de utilizare

Se obțin toamna două până la trei coase din amestecul furajer și o a treia ori a patra împreună cu porumbul siloz recoltat ca plantă întreagă după care se poate elibera terenul

Compoziție

16% Lolium bastard, 27% trifoi de Alexandria (Trifolium alexandrinum), raigras englezesc (Lolium perenne), 24% trifoi italian (Trifolium incarnatum), 18% raigras italian (Lolium Multiflorum)

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări

Recomandat în zonele de cultură cu favorabilitate ridicată pentru porumbul de siloz respectiv în interiorul arcului Carpatic, Crișana, Maramureș, Bucovina și anumite zone din Banat.

Perioada recomandată de semănat

Este posibil semănatul direct în miriștea de grâu/orz și oricând începând cu luna aprilie și până în august.

Potențial productiv în zone aride

3 tăieri

Potențial productiv în zone cu favorabilitate crescută


4 tăieri

Norma de semănat - înființare

30-40 kg/ha

Busola pentru alegerea amestecurilor semințelor pentru pășuni

- ✓ Pentru a vă ajuta să alegeți cele mai potrivite amestecuri destinate zonei dumneavoastră vă punem la dispoziție busola pentru a naviga între nenumăratele opțiuni create pentru orice provocare.
- ✓ Cu busola de mai jos puteți identifica ușor amestecul profesional de semințe pentru pășuni și fânețe adaptat cerințelor dumneavoastră.
- ✓ Dacă aveți întrebări suplimentare, managerul nostru de produs Antoneta Stoica vă va ajuta cu plăcere. Puteți găsi datele de contact relevante în secțiunea dedicată.
- ✓ Ne dorim să contribuim la succesul dumneavoastră și la un an 2024 îmbelșugat prin aceste noi amestecuri PROFI de la SAATBAU LINZ!





Categoriile amestecurilor cu semințe pentru pășuni și culturi furajare

		Zonare	Durata de utilizare (ani cu randament maxim)	Normă de semănat kg/ha	Tăieri/an	Disponibil în var. BIO	Compati- bilitate în zone aride	Furaj	Pășune	Siloz	Fân
Amestecuri furajare	Futterprofi EI Amestec pentru furajare pe tot parcursul anului	Locații cu aport pluviometric mediu spre mare	un an calendaristic	30	până la 4	BIO	0	+	-	+	0
	Futterprofi KM Amestec furajer pe bază de trifoi roșu	Locații aflate la altitudini joase spre medii	2-3 APU	25	până la 5	BIO	0	+	-	+	0
	Futterprofi KR Amestec furajer pe bază de trifoi pentru areale dificile	Locații dificile aflate la altitudini între 700 și 1200 m	2-3 APU	25	până la 4	BIO	+	+	-	+	0
	Futterprofi LR Amestec furajer de lucernă cu trifoi roșu	Locații cu profile de sol ușoare spre medii	2-3 APU	30	până la 4	BIO	+	+	-	+	0
	Futterprofi IM Amestec de specii furajare pentru sisteme intensive de exploatare	Locații cu altitudini până la 700m	2-3 APU	25	până la 6		0	+	-	+	0
Pajiști permanente	Grunlandprofi EB Amestec furajer cu randa- ment ridicat pentru zonele de luncă	Locații medii (exceptând zone aride ori terenuri grele)	pășune permanentă/ randament mare	30	până la 6	BIO	0	+	+	+	+
	Grunlandprofi B Amestec furajer pentru zonele de luncă	Locații cu aport pluviometric scăzut spre mediu, până la altitudini de 800m	pășune permanentă	30	până la 4	BIO	+	+	0	+	+
	Grunlandprofi OG Amestec pentru pășuni permanente fără ghizdei	Amestec recomandat pentru terenurile acide	pășune permanentă	25	până la 4		+	+	0	+	+
	Grunlandprofi G Amestec pentru pășini permanente fără obsigă nearistată	Locații aflate la altitudini joase spre medii de până la 800m	pășune permanentă	30	până la 4		0	0	+	0	0
	Grunlandprofi NA Amestec pentru locații cu altitudine joasă	Recomandat pentru ameliorarea terenurilor degradate	suprainsămânțare / reinsămânțare	10-25	până la 4	BIO	+	+	+	+	+
	Grunlandprofi NI Amestec de reinsămânțare pentru sisteme intensive de exploatare	Areale de cultură cu favorabilitate peste medie (pluviometrie peste medie, textură bună a solului)	suprainsămânțare pt. exploatații intensive	10-25	până la 6		0	+	+	+	+
	Grunlandprofi TOPP Amestec de reinsămânțare pentru sisteme intensive cu conținut ridicat de raigras și timoftică	Pentru sisteme intensive de exploatare fără o limitare atunci când prin excepție pluviometria este scăzută sub media zonei	suprainsămânțare pt. exploatații intensive	15-30	până la 6		-	+	+	+	0
	Grunlandprofi KB Amestec de reinsămânțare cu conținut ridicat de golomăț	Recomandat zonelor cu pluviometrie scăzută și condiții dificile de cultură	suprainsămânțare / reinsămânțare	15-30	până la 6	BIO	+	+	+	+	+
	Grunlandprofi BE Amestec pentru terasamente și zone cu exploatare redusă	Recomandat tuturor zonelor de cultură inclusiv cele cu condiții aride	limitată/ terasamente	30-60			+	0	0	0	0
	Grunlandprofi PS Amestec pentru cabaline	Pentru toate zonele de cultură	pășune permanentă	15-35	până la 3		0	0	+	-	+




DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO



DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO

COVOARE VEGETALE





DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO

Covoare vegetale cu beneficii multiple în completarea subvenției PNS 2024

COVOARE VEGETALE

- BODENFIT 
- NITROFIT
- WINTERFIT



Bodenfit



CEL MAI RĂSPÂNDIT AMESTEC DE SEMINȚE PENTRU COVOR VEGETAL

- ✓ Potrivit pentru un sol ameliorat
- ✓ Foarte bună soluție premergătoare pentru porumb precum și pentru soia ori sfeclă
- ✓ Susține micoriza
- ✓ Capacitate foarte mare de suprimare a buruienilor
- ✓ Pretabil tehnologiei de semănat cu drona sau prin împrăștiere
- ✓ Disponibil și în varianta certificată ecologic (semințe BIO)



BODENFIT® este amestecul universal adaptat tuturor rotațiilor în orice locație. Speciile din amestec și proporțiile acestora asigură o foarte bună descompunere și aprovizionare cu carbohidrați ușor de asimilat de microfauna din sol.

Amestecul se poate utiliza ca soluție premergătoare și atunci când se practică semănatul în mulci asigurând o acoperire satisfăcătoare a solului în acest scop.

BODENFIT® dezvoltă un sistem radicular multistratificat care variază de la specii cu rădăcini dezvoltate în orizontul superficial (MUNGO) până la sisteme radiculare pivotante (șofrănel LIZZ, ridiche albă lungă FORZA).

Aceste sistee radicular pe lângă îmbunătățirea structurii solului contribuie și la un aport semnificativ de humus.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Compatibilitate proiecte	compatibil cu PD-04 și PD-05	Perioada de semănat	începând cu luna august și până în septembrie singur sau cu normă redusă la 30-60% în amestec cu specii furajere uzuale până la jumătatea lunii octombrie
Rezistent peste iarnă	complet nerezistent peste iarnă	Înflorire	da
Calitatea patului germinativ înainte de semănat	înaltă (se poate semăna după o prelucrare superficială cu discul urmată de un combinator înainte de semănat; nu se poate semăna în sistem minimum tillage)	Compoziție	șofrănel LIZZY (Carthamus tinctorius), ridiche albă lungă FORZA (Raphanus sativus var. longipinnatus), trifoi de alexandria (Trifolium alexandrinum), fasole mung (Vigna radiata), mazăre de primăvara (Vicia sativa), iarbă de sudan (Sorghum × drummondii), în (Linum usitatissimum)
Normă semănat kg/ha	100 kg/ha		

Nitrofit

COVOR VEGETAL CU APORT RIDICAT DE AZOT

- ✓ NITROFIT asigură cel mai ridicat aport de azot în sol
- ✓ Cel mai crescut nivel de fixare a azotului
- ✓ Foarte bună capacitate de ameliorare a capilarității solului
- ✓ Acoperire rapidă și densă a solului suprimând astfel buruienile
- ✓ Nu necesită fertilizare chimică
- ✓ Disponibil și în varianta certificată ecologic (semințe BIO)



Beneficiile sporite ale covorului vegetal NITROFIT se bazează pe mazăre (furajeră și Lathyrus spp.) ca principale specii din amestec. Capacitatea deosebită de fixare a azotului reprezintă un avantaj semnificativ în rotația culturilor, mai ales în perioadele cu prețuri ridicate ale îngrășămintelor.

Beneficiile covorului NITROFIT nu se bazează doar pe mazăre ci pe întreg spectrul compus din 6 cultivare asigurate din 4 familii de plante. Această abordare maximizează potențialul de fixare a azotului, îmbunătățește textura solului și asigură o eficientă suprimare a buruienilor.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Compatibilitate proiecte	compatibil cu PD-04 și PD-05	Perioada de semănat	din iunie până în august (prima decadă în nord până în a doua jumătate în sud)
Rezistent peste iarnă	complet nerezistent peste iarnă	Înflorire	da
Calitatea patului germinativ înainte de semănat	înaltă (se poate semăna după o prelucrare superficială cu discul urmată de un combinator înainte de semănat; nu se poate semăna în sistem minimum tillage)	Compoziție	mazăre pigmentată MONI (Lathyrus spp.), mazărice (Vicia sativa), trifoi de alexandria (Trifolium alexandrinum), șofrănel LIZZY (Carthamus tinctorius), ridiche albă lungă FORZA (Raphanus sativus var. longipinnatus), mazăre furajeră (Pisum sativum), iarbă de sudan (Sorghum × drummondii), fasole mung (Vigna radiata)
Normă semănat kg/ha	60 kg/ha		

Winterfit

COVOR VEGETAL DESTINAT RECOLTĂRII ÎN MASA VERDE PENTRU FURAJARE PRIMĂVARA

- ✓ Furaj asigurat primăvara
- ✓ Amestec din specii viguroase
- ✓ Sistem radicular activ pe timpul iernii
- ✓ Se poate utiliza primăvara ca sursă de furaj proaspăt
- ✓ Este posibilă combinarea cu alte amestecuri furajere
- ✓ Amestecul are certificată ecologică (semințe BIO)



Există o serie de argumente în favoarea utilizării unor covoare vegetale rezistente la îngheț: acoperire continuă a solului, extinderea perioadei de vegetație, sistem radicular activ până primăvara în straturile superficiale ale solului și multe altele.

Noul amestec de covor vegetal BIO-WINTERFIT (cu minim 70% componente organice) oferă toate aceste avantaje.

BIO-WINTERFIT se poate semăna ca atare până la jumătatea lunii octombrie.

Se poate semăna în densitate redusă (30-60%) și în amestec cu specii ori mix-uri furajere.

Este o foarte bună sursă de aprovizionare cu furaj proaspăt devreme în primăvară.

CARACTERISTICI PRINCIPALE


Compatibilitate proiecte	compatibil cu PD-04 și PD-05	Perioada de semănat	-
Rezistent peste iarnă	da	Înflorire	nu
Calitatea patului germinativ înainte de semănat	înaltă	Compoziție	Măzărice panonică (Vicia panonica), nap de toamnă (Brassica rapa var. rapa), mazăre furajeră de toamnă (Pisum sativum), secară (Secale cereale)
Normă semănat kg/ha	90 kg/ha		





DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO

RAPIȚĂ DE TOAMNĂ






DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO

**Gama de hibrizi de ultimă generație
adaptată unor condiții variate de
cultură**

RAPIȚĂ DE TOAMNĂ

- PIROL
- KENTUCKY
- ASTANA
- TATIANA





Pirol

● TIMPURIU

- ✓ Hibrid intensiv de ultimă generație înregistrat în 2021
- ✓ Fereastră foarte largă de semănat datorită dezvoltării foarte rapide din toamnă
- ✓ Pachet superior de toleranță față de boli (Phoma prin gena Rlm 7 & TuYV/virusul galben al ridichii)



FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Ritm de dezvoltare toamna

Toleranța față de ger


Re luarea vegetației în primăvară

Rezistența la înclinare și frângere

Rezistența la scuturare

Toleranța față de Sclerotinia

Toleranța față de Phoma



CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Potențial de producție

foarte ridicat

Precocitatea înfloririi

semi-tardivă

Maturitate

semi-timpuriu

Înălțimea plantei

medie-înaltă / 165 - 175 cm

Masa a o mie de boabe (grame)

mediu

Conținut de ulei (%)

foarte ridicat (>47%)

Conținut de glucozinolați

foarte scăzut

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări

Recomandat a se însămânța oricând în fereastra optimă, inclusiv în ultima parte; semănatul timpuriu poate impune utilizarea regulatorilor de creștere în toamnele lungi.

Tehnologia de cultură


Clasică

Potențial productiv (boabe) în zone aride

Potențial productiv (boabe) în zone umede

Norma de semărare

45-55 b.g./mp



Legendă

- Rețeaua de testare proprie a Donau Saat și centre de testare a solurilor și hibrizilor
- Câmpuri demonstrative sau testare ale partenerilor

Kentucky

SEMI -TIMPURIU

- ✓ Hibrid de ultimă generație înregistrat în catalogul românesc al I.S.T.I.S. în 2023
- ✓ Manifestă o bună adaptare în areale aride de cultură prin dobândirea de producții superioare
- ✓ Foarte bună toleranță față de Phoma



FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Toleranța față de ger	foarte bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐
Reluarea vegetației în primăvară	bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
Rezistența la înclinare și frângere	foarte bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐
Rezistența la scuturare	bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
Toleranța față de Sclerotinia	bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
Toleranța față de Phoma	foarte bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Potențial de producție	ridicat și constant	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Precocitatea înfloririi	timpurie								
Maturitate	timpurie								
Înălțimea plantei	medie/ 100 - 140 cm								
Masa a o mie de boabe (grame)	mediu-mic 3,5-4,4 g								
Conținut de ulei (%)	mediu 40 - 42								
Conținut de glucozinolați	ridicat								

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări

Recomandat a se semăna în intervalul 15 august - 15 septembrie în toate zonele de producție a rapiței de toamnă cu o densitate sporită în funcție de calitatea pregătirii patului germinativ

Tehnologia de cultură

Clasică

- Potențial productiv (boabe) în zone aride
- Potențial productiv (boabe) în zone umede

Norma de semănare

70-100 b.g./mp

ridicat	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
ridicat	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐





Astana

SEMI-TARDIV

- ✓ Hibrid intensiv cu foarte mare plasticitate ecologica
- ✓ Foarte bună stabilitate productivă ritm rapid de creștere toamnă și reluare timpurie a vegetației coroborată cu capacitate ridicată de ramificare
- ✓ Înflorire timpurie și maturare semitardivă;



FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Ritm de dezvoltare toamna

rapid



Toleranța față de ger

foarte bună



Reluarea vegetației în primăvară

tardivă



Rezistența la înclinare și frângere

foarte bună



Rezistența la scuturare

foarte bună



Toleranța față de Sclerotinia

foarte bună



Toleranța față de Phoma

bună



CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Potențial de producție

foarte ridicat



Precocitatea înfloririi

timpurie

Maturitate

semi-tardivă

Înălțimea plantei

joasă / 160 cm

Masa a o mie de boabe (grame)

mediu

Conținut de ulei (%)

foarte ridicat (>47%)

Conținut de glucozinolați

foarte scăzut

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări

Recomandat a se însămânța oricând în fereastra optimă, inclusiv în ultima parte; semănatul timpuriu poate impune utilizarea regulatorilor de creștere în toamnele lungi.

Tehnologia de cultură

Clasică

Potențial productiv (boabe) în zone aride

Potențial productiv (boabe) în zone umede


Norma de semănare

45-55 b.g./mp

ridicat



foarte ridicat



Legendă

- Rețeaua de testare proprie a Donau Saat și centre de testare a solurilor și hibrizilor
- Câmpuri demonstrative sau testare ale partenerilor



Tatiana

SEMI-TIMPURIU

- ✓ Hibrid intensiv de mare capacitate productiva
- ✓ Peste 12% spor de producție fata de medie (3 ani; 31 locatii)
- ✓ Risc redus de alungire a tijeii floare în toamnă; se recomandă insamantarea pâna la jumătatea epocii optime



FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Ritm de dezvoltare toamnă

mediu

Toleranța față de ger

foarte bună

Reluarea vegetației în primăvară

semi-timpurie

Rezistența la înclinare și frângere

foarte bună

Rezistența la scuturare

bună

Toleranța față de Sclerotinia

foarte bună

Toleranța față de Phoma

bună

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Potențial de producție

ridicat

Precocitatea înfloririi

medie

Maturitate

semi-timpurie

Înălțimea plantei

joasă / 150-160 cm

Masa a o mie de boabe (grame)

mediu-ridicată 5.1 - 6.2 g

Conținut de ulei (%)

foarte ridicat 46-48%

Conținut de glucozinolați

foarte scăzut

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări

Recomandat a se însămânța în prima jumătate a epocii; adaptat pentru toate zonele de cultură a rapiței de toamnă

Tehnologia de cultură

Clasică

Potențial productiv (boabe) în zone aride


Potențial productiv (boabe) în zone umede

Norma de semănare

45-55 b.g./mp

foarte ridicat

ridicat




Legendă

- Rețeaua de testare proprie a Donau Saat și centre de testare a solurilor și hibrizilor
- Câmpuri demonstrative sau testare ale partenerilor



DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO

CEREALE PĂIOASE TOAMNĂ





DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO

Gama de hibrizi și soiuri de ultimă generație adaptată unor condiții variate de cultură

CEREALE PĂIOASE TOAMNĂ

— APEXUS
(GRÂU)

— AMICUS
(GRÂU)

— CSIKO
(GRÂU)

— GUIDO
(GRÂU)

— CHEVIGNON
(GRÂU)

— PARACELsus
(SPELTA)



— ADALINA
(ORZ)



— SUEZ
(ORZOAICĂ)

— LENTIA
(ORZOAICĂ)



— TRIBONUS
(TRITICALE)

— DUKATO
(SECARĂ)



GRÂU

Apexus

TIMPURIU

ARISTAT

DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO

- ✓ Soi de generație nouă (înregistrat 2019)
- ✓ Foarte bună plasticitate ecologică confirmată prin stabilitatea producțiilor
- ✓ Unul din cele mai timpurii soiuri din portofoliu



FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Toleranța față de ger	foarte bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Rezistența la înclinare și cădere	medie-bună	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Rezistență la încolțirea în spic	foarte bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Toleranța față de <i>Blumeria</i> (făinare)	foarte bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Toleranța față de <i>Puccinia striiformis</i> (rugina galbenă)	foarte bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Toleranța față de <i>Puccinia recondita</i> (rugina brună)	medie-bună	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Toleranța față de <i>Septoria tritici</i>	medie-slabă	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Toleranța față de <i>Septoria nodorum</i>	medie	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Toleranța față de <i>Fusarium</i>	bună	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Potențial de producție	ridicat	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Calitatea producției	A	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Înspicare	timpurie	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐
Maturitate	timpurie	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Capacitate de înfrățire	mare	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
Număr de boabe în spic	mediu	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Masa a o mie de boabe (grame)	foarte mare	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Masa hectolitrică (kg/hl)	medie-ridică	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Conținut de proteină	mediu 75.9 - 82.8 * kg	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Gluten	mediu-slab 10.9% - 16.4% *	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Indice de cadere	mediu-bun 25 - 72 *	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Grupa de calitate a aluatului	A	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐

Tipul spicului

Aristat, mediu-compact

Înălțimea plantei

Medie / 70 - 80 cm

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE


Zonare și recomandări

Recomandat în toate zonele de cultură a grâului.

Norma de semănat

350 - 500 b.g./mp

Potențial productiv în zone aride

foarte ridicat ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐

Legendă

- Rețeaua de testare proprie a Donau Saat și centre de testare a solurilor și hibrizilor
- Câmpuri demonstrative sau testare ale partenerilor





Amicus

F. SEMITIMPURIU

NEARISTAT

- ✓ Soi de mare productivitate cu capacitatea de a asigura calitatea solicitată de morari
- ✓ Principalele caracteristici sunt timpurietatea și stabilitatea producțiilor
- ✓ Cel mai timpuriu dintre soiurile consacrate; foarte bună rezistență la cădere



FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Toleranța față de ger	medie								
Rezistența la înclinare și cădere	foarte bună								
Rezistența la încolțirea în spic	bună								
Toleranța față de <i>Blumeria</i> (făinare)	medie								
Toleranța față de <i>Puccinia striiformis</i> (rugina galbenă)	bună								
Toleranța față de <i>Puccinia recondita</i> (rugina brună)	medie								
Toleranța față de <i>Septoria tritici</i>	medie								
Toleranța față de <i>Fusarium</i>	medie								

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Potențial de producție	ridicat								
Calitatea producției	A								
Înspicare	semi-timpurie								
Maturitate	semi-timpurie								
Capacitate de înfrățire	medie								
Număr de boabe în spic	foarte mare								
Masa a o mie de boabe (grame)	mare								
Masa hectolitrică (kg/hl)	mare								
Conținut de proteină	mediu								
Gluten	mediu								
Indice de sedimentare	bun								
Indice de cadere	bun								
Capacitate de absorbție a apei	medie								
Stabilitatea aluatului	foarte bună								
Volum aluat	mediu-ridicat								
Grupa de calitate a aluatului	A								

Tipul spicului

Nearistat, mediu-lung, lax

Înălțimea plantei

Joasă / 60 - 75

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări

Recomandat în toate zonele de cultură a grâului.


Potențial productiv în zone aride

Potențial productiv în zone aride

Norma de semănat

400 - 500 b.g./mp

foarte ridicat									
mediu-ridicat									



Legendă

- Rețeaua de testare proprie a Donau Saat și centre de testare a solurilor și hibrizilor
- Câmpuri demonstrative sau testare ale partenerilor

GRÂU

Csiko

SEMITIMPURIU

ARISTAT

DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO

- ✓ Soi de grâu plasat la începutul grupei semitiimpurie de maturitate
- ✓ Soiul CSIKO este creat astfel încât imbină un bun echilibru între cantitatea și calitatea producțiilor având indici buni pentru panificație
- ✓ **Soi autohton** cu mare plasticitate ecologică; înregistrat în România



FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Toleranța față de ger	foarte bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Rezistența la înclinare și cădere	medie-bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
Rezistență la încolțirea în spic	foarte bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Toleranța față de <i>Blumeria</i> (făinare)	foarte bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Toleranța față de <i>Puccinia striiformis</i> (rugina galbenă)	bună	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Toleranța față de <i>Puccinia recondita</i> (rugina brună)	bună	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Toleranța față de <i>Septoria tritici</i>	medie	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Toleranța față de <i>Septoria nodorum</i>	bună	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Toleranța față de <i>Fusarium</i>	medie	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Potențial de producție	ridicat	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Calitatea producției	B	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Înspicare	semi-timpurie	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Maturitate	timpurie	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Capacitate de înfrățire	mare	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
Număr de boabe în spic	mare	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
Masa a o mie de boabe (grame)	mare	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Masa hectolitrică (kg/hl)	mare	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
Conținut de proteină	foarte ridicat	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Gluten	ridicat	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Indice de sedimentare	foarte ridicat	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Indice de cadere	bun	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
Capacitate de absorbție a apei	medie	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
Stabilitatea aluatului	foarte bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Alungirea aluatului	bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
Deformare	foarte bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Volum aluat	bun	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
Grupa de calitate a aluatului	B	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐

Tipul spicului

Aristat, lung, lax, cu formă nutanată

Înălțimea plantei

Mare / 80-90 cm

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări: Recomandat în toate zonele de cultură a grâului. Adaptat și pentru datele târzii de semănat. Evoluează favorabil și în soluri ușoare.

Norma de semănat
350-420 b.g./mp


Potențial productiv în zone aride

ridicat



Potențial productiv în zone aride

foarte ridicat



Legendă

- Rețeaua de testare proprie a Donau Saat și centre de testare a solurilor și hibrizilor
- Câmpuri demonstrative sau testare ale partenerilor



- ✓ Soi rustic cu o largă plasticitate ecologică
- ✓ Cel mai bun randament este obținut în zone colinare și de podiș iar în anii favorabili poate obține producții însemnate (top 3) în zonele de câmpie



FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Toleranța față de ger	foarte bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Rezistența la înclinare și cădere	medie-bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
Rezistența la încolțirea în spic	foarte bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Toleranța față de <i>Blumeria</i> (făinare)	bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
Toleranța față de <i>Puccinia striiformis</i> (rugina galbenă)	bună	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Toleranța față de <i>Puccinia recondita</i> (rugina brună)	bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
Toleranța față de <i>Septoria tritici</i>	medie	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Toleranța față de <i>Septoria nodorum</i>	bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
Toleranța față de <i>Fusarium</i>	medie	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Potențial de producție	ridicat	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Calitatea producției	A	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
Înspicare	semi-timpurie	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Maturitate	timpurie	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
Capacitate de înfrățire	mare	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Număr de boabe în spic	mare	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Masa a o mie de boabe (grame)	mare	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
Masa hectolitrică (kg/hl)	mare	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
Conținut de proteină	foarte ridicat	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Gluten	ridicat	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Indice de sedimentare	foarte ridicat	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Indice de cadere	bun	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
Capacitate de absorbție a apei	medie	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Stabilitatea aluatului	foarte bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Alungirea aluatului	-	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Deformare	foarte bună	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Volum aluat	bun	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Grupa de calitate a aluatului	Elita	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐

Tipul spicului
Aristat, lung, lax, cu formăa nutanată


Înălțimea plantei
Mare / 90 - 130 cm

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări: Recomandat în toate zonele de cultură a grâului. Adaptat și pentru datele târzii de semănat. Evoluează favorabil și în soluri ușoare.

Norma de semănat
350-420 b.g./mp

Potențial productiv în zone aride	foarte ridicat	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Potențial productiv în zone aride	mediu-ridicat	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐



Legendă

- Rețeaua de testare proprie a Donau Saat și centre de testare a solurilor și hibrizilor
- Câmpuri demonstrative sau testare ale partenerilor

GRÂU

DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO

Chevignon



SEMITARDIV

NEARISTAT

- ✓ Singurul soi de grâu fara indici superiori de panificație din portofoliu
- ✓ Provine din programe moderne de ameliorare adaptat provocărilor climatice actuale
- ✓ Grâu cu mare capacitate de producție de talie joasă și foarte bună plasticitate ecologică



FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Toleranța față de ger	bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Rezistența la înclinare și cădere	foarte bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Rezistență la încolțirea în spic	foarte bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Toleranța față de <i>Blumeria</i> (făinare)	bună	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
Toleranța față de <i>Puccinia striiformis</i> (rugina galbenă)	foarte bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Toleranța față de <i>Puccinia recondita</i> (rugina brună)	medie	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Toleranța față de <i>Septoria tritici</i>	bună	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
Toleranța față de <i>Fusarium</i>	medie	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Potențial de producție	foarte ridicat	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Calitatea producției	Grupa C	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Înspicare	semi-tardiva	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Maturitate	semi-tardiva	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Capacitate de înfrățire	foarte mare	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Număr de boabe în spic	foarte mare	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Masa a o mie de boabe (grame)	mare	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Masa hectolitră (kg/hl)	mare	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Conținut de proteină	mediu-scăzut	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Gluten	mediu-scăzut	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Indice de sedimentare	mediu	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Indice de cadere	mediu	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Capacitate de absorbție a apei	medie	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Grupa de calitate a aluatului	n/c	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐


Tipul spicului
Nearistat, lung și laxÎnălțimea plantei
Joasă / 60-70 cm

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări: Recomandat în toate zonele de cultură a grâului. Nu necesită utilizarea regulatorilor de creștere; se recomandă aplicarea T3 în cazul apariției condițiilor favorabile bolilor de spic și frunza standard.

Norma de semănat
350 - 450 b.g./mp

Potențial productiv în zone aride	ridicat	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Potențial productiv în zone aride	foarte ridicat	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐



Legendă

- Rețeaua de testare proprie a Donau Saat și centre de testare a solurilor și hibrizilor
- Câmpuri demonstrative sau testare ale partenerilor

Paracelsus

● SPELTA ● ARISTAT

- ✓ Talie medie-înaltă
- ✓ Calitate înaltă pentru panificație
- ✓ Potențial ridicat de producție

FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Toleranța față de ger	bună								
Rezistența la înclinare și cădere	medie-bună								
Rezistență la încolțirea în spic	foarte bună								
Toleranța față de <i>Blumeria</i> (făinare)	foarte bună								
Toleranța față de <i>Puccinia striiformis</i> (rugina galbenă)	bună								
Toleranța față de <i>Puccinia recondita</i> (rugina brună)	bună								
Toleranța față de <i>Septoria tritici</i>	medie								
Toleranța față de <i>Septoria nodorum</i>	bună								
Toleranța față de <i>Fusarium</i>	medie								

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Potențial de producție	ridicat								
Calitatea producției	bună								
Înspicare	semi-timpurie								
Maturitate	timpurie								
Capacitate de înfrățire	mare								
Număr de boabe în spic	mare								
Masa a o mie de boabe (grame)	mare								
Masa hectolitrică (kg/hl)	mare								
Conținut de proteină	foarte ridicat								
Gluten	ridicat								
Indice de sedimentare	foarte ridicat								
Indice de cadere	bun								
Capacitate de absorbție a apei	bună								
Stabilitatea aluatului	foarte bună								
Alungirea aluatului	foarte bună								
Deformare	foarte bună								
Volum aluat	bună								
Grupa de calitate a aluatului	foarte bună								

Tipul spicului
Nearstat, lung, lax, cu forma nutanată

Înălțimea plantei
Mare / 80-90 cm

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări: Recomandat în toate zonele de cultură a grâului. Adaptat și pentru datele târzii de semănat. Evoluează favorabil și în soluri ușoare.

Norma de semănat
160-220 kg/ha (110 - 150 b.g./mp)

Potențial productiv în zone aride	ridicat								
Potențial productiv în zone aride	foarte ridicat								





DONAU SAAT

Binealegibineculegi.ro



Adalina

Cel mai apreciat
soi de orz de toamnă din oferta
Donau Saat în România

Chevignon

Cel mai nou soi de grâu
de toamnă cultivat în România
începând cu 2022

Adalina



F. SEMITIMPURIU

- ✓ Soi de ultimă generație conceput pentru producții sporite de o calitate ridicată
- ✓ ADALINA este un soi cu maturare timpurie, de talie medie-joasă
- ✓ Prezintă o tulpină elastică și foarte rezistentă la frângere



FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Toleranța față de ger	medie								
Rezistența la înclinare și cădere	medie-bună								
Rezistența la frângere	bună								
Rezistență la căderea spicelor	medie-bună								
Toleranța față de Blumeria (făinare)	bună								
Toleranța față de BYMV (virusul mozaic)	foarte bună								
Toleranță față de rugini	bună								
Toleranță față de Pyrenophora (pătarea reticulară)	bună								
Toleranță față de Rhynchosporium (arsura frunzelor)	bună								
Toleranță față de Ramularia	mediu-bună								

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Potențial de producție	ridicat								
Calitatea producției	-								
Înspicare	semi-timpurie								
Maturitate	semi-timpurie								
Capacitate de înfrățire	mare								
Număr de boabe în spic	mare								
Masa a o mie de boabe (grame)	mare								
Masa hectolitrică (kg/hl)	medie-bună								
Conținut de proteină	mare								

Tipul spicului
Aristat, compact

Înălțimea plantei
Medie / 80-90 cm


CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări:

Recomandat în toate zonele de cultură a orzului. Pentru rezultate superioare se recomandă însămânțarea în prima jumătate a epocii.

Norma de semănat

300 - 450 b.g./mp



Legendă

- Rețeaua de testare proprie a Donau Saat și centre de testare a solurilor și hibrizilor
- Câmpuri demonstrative sau testare ale partenerilor



ORZ 2R TOAMNĂ (MALȚ)



DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO

Suez

SEMITIMPURIU

- ✓ Soi de ultima generație de orz de toamnă pe 2 rânduri dezvoltat pentru arealuri aride de cultură
- ✓ Începand cu primăvară anului 2021 a fost inclus pe listă verde a Heineken fiind agreeat pentru maltificare



FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Toleranța față de ger	medie	
Rezistența la înclinare și cădere	bună	
Rezistența la frângere	bună	
Rezistență la căderea spicelor	medie	
Toleranța față de Blumeria (făinare)	medie	
Toleranța față de BYDV (virusul piticirii)	mediu-slabă	
Toleranța față de BYMV (virusul mozaic)	foarte bună	
Toleranța față de Monographella n. (mușgaiul zăpezii)	medie	
Toleranță față de rugini	bună	
Toleranță față de Pyrenophora (pătarea reticulară)	medie	
Toleranță față de Rhynchosporium (arsura frunzelor)	bună	
Toleranță față de Ramularia	mediu-slabă	

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Potențial de producție	ridicat	
Calitatea producției	-	
Înspicare	semi-timpurie	
Maturitate	semi-timpurie	
Capacitate de înfrățire	-	
Număr de boabe în spic	mare	
Masa a o mie de boabe (grame)	mediu	
Masa hectolitrică (kg/hl)	medie	
Calibraj (boabe > 2.2 mm)	mare	
Calibraj (boabe > 2.5 mm)	ridicat	
Conținut de proteină	mediu	
Conținut de fibră	mare	


Tipul spicului
Aristat, compact

Înălțimea plantei
Medie / 75-85 cm

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări: Recomandat în toate zonele de cultură a orzului. Pentru încadrarea în parametrii de maltificare trebuie reduse aporturile de N. Semănatul optim se poate încadrează în ultima decadă din septembrie respectiv până în prima decadă din octombrie.

Norma de semănat
300 - 450 b.g./mp



Legendă

- Rețeaua de testare proprie a Donau Saat și centre de testare a solurilor și hibridilor
- Câmpuri demonstrative sau testare ale partenerilor



SEMITARDIV

- ✓ LENTIA este cel mai recent omologat soi de orzoaică de toamnă
- ✓ Soiul reprezintă un echilibru între producții ridicate cu boabe de calibru mare și maturare semi-tardivă
- ✓ LENTIA ocupă o poziție frunsoasă în clasamentul AGES privind producția cantitativă

[illegible]

Caracteristică	Clasă	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Potențial de producție	ridicat	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Calitatea producției	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Înspicare	semi-timpurie	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□
Maturitate	semi-tardivă	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□
Capacitate de înfrățire	mare	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□
Număr de boabe în spic	mare	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□
Masa a o mie de boabe (grame)	foarte ridicat	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□
Masa hectolitră (kg/hl)	mare	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□
Calibraj (boabe > 2.5 mm)	foarte ridicat	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□
Conținut de proteină	mediu	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□
Conținut de fibră	mediu	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□

Înălțimea plantei
Medie-joasă / 65-80 cm

Comuna	Yield (kg/ha)
Caracal, OT	7468
Dulcești, NT	6522
Turda, CJ	12118
Lovrin, TM	6406
Scănteia, IL	3600
Podu Iloaiei, IS	5769
Râscăneți, DB	6330



- Rețeaua de testare proprie a Donau Saat și centre de testare a solurilor și hibridilor
- Câmpuri demonstrative sau testare ale partenerilor

TRITICALE

DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO

Tribonus

SEMITIMPURIU

- ✓ Soi de triticale nou, adaptat cerințelor cultivatorilor
- ✓ Este recomandat în special pentru tehnologie intensivă
- ✓ Favorizează resursele de aport N chimic și organic; producția de boabe are MMB mic și MHL mare.



FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Rezistența la înclinare și cădere	mare	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
Toleranța față de Blumeria (făinare)	bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
Toleranța față de P. striif. (rugina galbenă)	-	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Toleranța față de Septoria t.	foarte ridicată	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
Toleranța față de Septoria n.	medie	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Potențial de producție	ridicat	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Calitatea producției	B	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Înspicare	semi-tardivă	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Maturitate	semi-timpurie	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Capacitate de înfrățire	medie	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Număr de boabe în spic	mare	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Masa a o mie de boabe (grame)	medie	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Masa hectolitică (kg/hl)	ridică	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐

Tipul spicului

Nearistat, semi-compact

Înălțimea plantei

Medie-mare / 90-140 cm

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări:

Recomandat în toate zonele de cultură a grâului.


Norma de semănat

320 - 450 b.g./mp

Potențial productiv în zone aride

Potențial productiv în zone aride

ridicat	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
ridicat	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐



Legendă

- Rețeaua de testare proprie a Donau Saat și centre de testare a solurilor și hibrizilor
- Câmpuri demonstrative sau testare ale partenerilor

- ✓ Soi rustic, consacrat în rândul cultivatorilor
- ✓ Se evidențiază prin stabilitatea multianuală a producțiilor



FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Toleranța față de ger	foarte bună	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Rezistența la înclinare și cădere	medie	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Toleranța față de Blumeria (făinare)	medie	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Toleranța față de P. rec. (rugina brună)	medie-joasă	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

CARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE

Potențial de producție	ridicat	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Calitatea producției	B	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Înspicare	semi-timpurie	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Maturitate	semi-timpurie	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Capacitate de înfrățire	medie	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Număr de boabe în spic	mare	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Masa a o mie de boabe (grame)	medie	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Masa hectolitrică (kg/hl)	medie	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Conținut de proteină	mediu-scăzut	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Indice de cadere	mediu	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐

Tipul spicului

Nearistat, semi-compact

Înălțimea plantei

Medie-mare / 90 - 120 cm


CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări:

Recomandat în toate zonele de cultură a grâului.

Norma de semănat

320 - 450 b.g./mp





Legendă

- Rețeaua de testare proprie a Donau Saat și centre de testare a solurilor și hibrizilor
- Câmpuri demonstrative sau testare ale partenerilor



Prezentarea portofoliului în câmpurile expoziționale în 2024





**Locație: Braşov,
județul Braşov**
Gazdă: Agorent

**Locație: Răscăeți,
județul Dâmbovița**
Gazdă: Agro Excel Balkans

**Locație: Maxineni,
județul Brăila**
Gazdă: SC Agroholding SA

**Locație: Maxineni,
județul Brăila**
Gazdă: TNT Mirtan

**Locație: Maxineni,
județul Brăila**
Gazdă: Isavlanagro

**Locație: Scurtu Mare,
județul Teleorman**
Gazdă: Polirom Prod

**Locație: Putineiu,
județul Giurgiu**
Gazdă: Balaban Ionuț



Megheleș Ion

Area sales manager

Județe: Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Caraș-Severin



0748 141 317



ion.megheles@donausaat.com

Depozit: Arad, Flavius Pușcaș

Telefon: 0735 528 027

*Adresă: Arad, Str. Câmpurilor,
Nr. 2M, în incinta DivaSol*



Florea Dan

Area sales manager

Județe: Cluj, Mureș, Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu,
Hunedoara, Alba, Bistrița-Năsăud



0757 013 954



dan.florea@donausaat.com

Depozit: Alba, Marius Mihai

Telefon: 0756 635 237

*Adresă: Comuna Sântimbru,
DN 1, în incinta Agrosem Seed*



Boghici Nicoleta

Area sales manager

Județe: Dolj, Olt, Gorj, Mehedinți, Vâlcea



0751 169 840



nicoleta.boghici@donausaat.com



Paraschiv Ioan

Area sales manager

Județe: Teleorman, Giurgiu, Dâmbovița, Argeș, Prahova, Ilfov



0724 564 508



ioan.paraschiv@donausaat.com



DONAU SAAT



BINEALEGIBINECULEGI.RO



DONAU SAAT

Vîntu Mihai

Area sales manager

Județe: Botoșani, Suceava, Iași, Neamț



0757 013 953



mihai.vintu@donausaat.com

Depozit: Botoșani, Mihai Lungu

Telefon: 0771 714 260

Adresă: Loc. Manastirea

Doamnei, com. Curtești, str.

Unirii, Nr. 216



DONAU SAAT

Baciu Eduard

Area sales manager

Județe: Galați, Vrancea, Bacău, Vaslui



0748 106 284



eduard.baciu@donausaat.com



DONAU SAAT

Tite Vlad

Area sales manager

Județe: Buzău, Brăila, Ialomița



0745 302 133



vlad.tite@donausaat.com



DONAU SAAT

Dunăroaia Ionela

Area sales manager

Județe: Constanța, Tulcea, Călărași



0733 081 557



ionela.dunaroaia@donausaat.com

Depozit: Călărași, Radu Ciobotaru

Telefon: 0748 226 079

Adresă: DN3, Com.

Belciugatele, Blvd. Valea

Belciugatelor, Nr. 17



CU  DONAU SAAT

hectarul tău se învârte

DUPĂ SOARE



DONAU SAAT
BINEALEGIBINECULEGI.RO